비산성소염 • 진통제

에마존® 정(에몰파존)

Emazon® Tablet

KGMP 적격업체제품

전문의약품 분류번호 114

현재 대부분의 소염 • 진통제는 프로스타그란딘 생합성을 저해하여 작용을 나타내지만, 그것이 부작용의 원인이 되기도 합니다.
이 부작용을 경감시키기 위해서 Prodrug이나 좌제 등 여러가지 형태가 개발되고 있지만 역시 프로스타그란딘에 작용하는 약물입니다. 그러므로 요즈음은 부작용이 적으면서 작용이 강한 약물이 요구되고 있습니다.
에마존 정은 프로스타그란딘의 생합성을 저해하지 않고 염증과 통증반응의 주요소인 브라디키닌의 유리를 억제하는 비산성(非酸性)소염 • 진통제입니다.

●원료약품의 분량 : 1정 중
에몰파존(별규) ····· 200㎎

●성상 : 백색의 원형 제피정

●효능 • 효과
1. 다음 질환에 사용할 수 있습니다.
   골관절염(퇴행성 관절질환), 경견완증후군, 견관절주위염, 요통, 회음열상, 수술후 • 외상후 염증 및 동통

●용법 • 용량
성인:에몰파존으로서 1회 200mg, 1일 3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

●사용상의 주위사항
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 소화성궤양 환자
   2) 심한 혈액이상 환자
   3) 심한 간장애 환자
   4) 심한 신장애 환자
   5) 이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 소화성궤양의 병력이 있는 환자
   2) 과민증의 병력이 있는 환자
3. 부작용
   1) 과민증 : 때때로 발진 드물게 광과민증 등이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
   2) 소화기 : 때때로 구내염, 식욕부진, 구역, 구토, 위통, 설사, 구갈, 위부불쾌감, 가슴쓰림, 변비, 입과 혀가 거칠어지는 증상 등이 나타날 수 있습니다.
   3) 정신신경계 : 때때로 두통, 현기, 권태, 졸음, 드물게 지각이상 등이 나타날 수 있습니다. 대량투여에 의해 환각, 경련 등이 나타날 수 있습니다.
   4) 순환기 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
   1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대중요법임에 유의하십시오.
   2) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.
      ① 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여하십시오.
      ② 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피하십시오.
      ③ 원인요법이 있으면 그것을 실시하십시오.
   3) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의하십시오.
   4) 감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여하십시오.
   5) 다른 소염진통제와 병용은 피하는 것이 바람직합니다.
   6) 고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의하십시오,
5. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여
   1) 임부, 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부에 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여하십시오.
   2) 어린이에 대한 안전성은 확립되어 있지 않습니다.(사용경험이 적습니다)

●저장방법
기밀용기

●포장단위
10, 100, 200, 500정

※유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질 • 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.
※이 첨부문서 작성일자(2003년 12월 3일)이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.samjinpharm.co.kr)나 전화(02-338-5511소비자상담실)를 통해 알 수 있습니다.

보험등재 Code : A12701281

설명서개정일 : 2004. 6
®=등록상표
EM-03-03-1171

제조판매원
삼진제약주식회사
본 사 : 서울특별시 마포구 서교동 338-8
공 장 : 경기도 화성시 향남면 상신리 904-2
☎ : 본사(02)338-5511, 공장(031)353-1712/6