

非 atropine성 진경제

푸로시놀[®] 정

KGMP
적격업체제품

전문약품
분류번호 124

FUROSINOL[®] Tablet

푸로시놀정은 Phloroglucin을 주성분으로 하는 진경제로써 기존의 진경제와는 달리 COMT(catechol-o-methyltransferase)의 활성저해에 의한 아드레날린(adrenaline) 작동성 기전에 의해 담도계, 요로계의 평활근의 연축을 완해하고 이러한 臟器의 경련성 질환에 효과가 있는 제제입니다.

또한 **푸로시놀**정은 부교감신경 차단작용(anticholinergic effect)에 의하지 않고 진경작용을 나타내기 때문에 전립선 비대 환자나 녹내장 환자에게도 투여할 수 있는 제제입니다.

■ 원료약품의 분량

1정 중

플로로글루신(식약청고시)..... 80mg

트리메칠플로로글루신(별규)..... 80mg

■ 성상: 분홍색의 당의정

■ 약리작용 및 특징

1. **푸로시놀**정은 COMT(catechol-o-methyltransferase)의 활성을 저해함으로써 아드레날린(adrenaline)의 활성증가에 의해 담도계, 요로평활근의 울동을 억제시켜 줍니다.
2. **푸로시놀**정은 非아트로핀성 진경제로써 atropine과 같은 부교감 차단작용을 나타내지 않으므로 녹내장환자, 전립선 비대 환자에게도 투여할 수 있습니다.
3. **푸로시놀**정은 평활근의 경련을 안정시키고 통증을 없애줍니다.
4. **푸로시놀**정은 oddi괄약근의 이완작용을 갖습니다.

■ 효능·효과

- 비뇨기계의 경련 및 통증: 신염성 산통
- 소화관 및 담도계의 기능장애에 의한 통증
- 부인과의 경련성 통증
- 임신중의 수축의 보조치료

■ 용법·용량

성인 1회 2정 1일 2~3회 경구 투여한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약에 과민증 환자
2. 부작용
 - 1) 소화기계: 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 위통 등의 위장장애, 구갈이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.
 - 2) 정신신경계: 때때로 두중감, 두통, 어지러움, 권태가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.
 - 3) 기타: 때때로 발한, 요의감퇴가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량, 휴약 등의 적절한 처치를 한다.
 - 4) 피부: 알레르기반응이 나타날 수 있다.
3. 상호작용
이 약은 진경작용을 나타내므로 모르핀 또는 그 유도체와 같은 진통제와는 병용투여하지 않는 것이 바람직하다.
4. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 동물실험에서 태자독성 및 기형발생은 나타나지 않았으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인(특히 초기 3개월)에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 2) 수유중에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

■ 저장방법

차광기밀용기, 실온(1~30°C)보관

■ 포장단위

60, 100, 300, 500정

※ 사용기한 및 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환해 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일자(2004년 9월 1일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)나 전화(02-338-5511 소비자 상담실)를 통해 알 수 있습니다.
보험등재 Code : A12701541

설명서 개정일: 2004. 9

® = 등록상표

FL-03-05-1171

Products under License from
Cephalon France

제조판매원



삼진제약주식회사

본 사 : 서울특별시 마포구 서교동 338-8

공 장 : 경기도 화성시 향남면 상신리 904-2

☎ : 본사(02)338-5511, 공장(031)353-1712/6