


바딜 정

Bardil Tabs.
(Nicorandil)



【원료약품 및 그 분량】 1정 중
니코란딜 (식약청고시)

5mg

【성 상】
흰색의 원형정제

【약 리 작 용】

1. 관혈관확장 작용 : 마취개흉(麻醉開胸)한 개에게 정주 또는 십이지장내 투여로 관혈류량의 일상성(一相性) 증가와 그 지속이 용량의존적으로 인지되었습니다.
2. 심·혈행동태에 대한 영향 : 마취개흉한 개에게 정주하면 용량의존적으로 혈압을 저하시키나 그 정도는 경미합니다. 관혈관저항을 유의적으로 저하하는 용량에 있어 심박동수·심근수축력·심근산소소비량·방실정도시간에는 영향을 미치지 않았습니다.

【효능·효과】
협심증

【용법·용량】

성인: 니코란딜로서 1회 5mg 1일 3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 심인성 속 환자
 - 2) 저충만압을 수반하는 좌심부전 환자
 - 3) 저혈압 환자
 - 4) 이 약에 과민증 또는 특이체질 환자
 - 5) 구연산 실데나필을 복용하고 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 녹내장 환자
 - 2) 중증의 간장애 환자
 - 3) 급성 폐부종 환자
 - 4) 고령자
3. 부 작 용
 - 1) 순환기계 : 때때로 심계항진, 안면홍조, 드물게 전신권태감, 불쾌감, 흉통, 하지부종, 홍분 등이 나타날 수 있다.
 - 2) 정신신경계 : 두통, 때때로 두중감, 어지러움, 드물게 이명, 불면, 졸음, 혀의 마비, 어깨결림 등이 나타날 수 있다.
 - 3) 과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 4) 소화기계 : 구내염, 때때로 구역, 구토, 식욕부진, 드물게 설사, 변비, 위체, 위부불쾌감, 위통, 복통, 복부팽만감, 구각염, 구갈 등이 나타날 수 있다.
 - 5) 간장 : 때때로 빌리루빈, ALT, AST, ALP 상승 등이 나타날 수 있다.
 - 6) 혈액계 : 혈소판 감소증이 나타나는 경우가 있다.
 - 7) 기타 : 드물게 경부통, 복시 등이 나타날 수가 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 이 약 투여중에는 자동차운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
 - 2) 투여 개시시에 질산, 아질산 에스테르계 약제와 같이 혈관 확장작용에 의한 박동성 두통이 일어나는 경우가 있으므로 이와 같은 경우에는 감량 또는 중지하는 등 적절한 처치를 행한다.
 - 3) 해외에서는 심한 구내궤양이 보고되고 있으므로 증상이 나타나는 경우에는 중지하여 적절한 처치를 한다.
 - 4) 구연산 실데나필의 병용은 이 약의 저혈압효과를 상승시켜, 과다하게 혈압을 저하시킬 수 있기 때문에 이 약을 복용하기 전 구연산 실데나필의 사용을 보증할 수 없다. 더욱이 이 약을 복용후, 또는 복용하는 동안 환자는 구연산 실데나필을 함께 복용할 수 없다.
5. 상호작용
 - 1) 이 약은 다른 혈관확장제, 삼환계 항우울제 및 알코올의 혈압강하작용을 증강시킬 수 있다.
 - 2) 구연산 실데나필을 함께 복용할 수 없다. (저혈압 효과를 상승시킬 수 있다.)
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않았으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 2) 모유중으로의 이행이 보고된 바 없으므로 치료중에는 수유를 중단한다.
7. 소아에 대한 투여
소아에 대한 이 약의 안전성은 확립되어 있지 않다.
8. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 부작용이 나타나기 쉬우므로, 저용량에서 투여를 시작하는 등 신중히 투여한다.
9. 과량투여시의 처치
과량투여시 말초혈관이 확장되어 저혈압과 반사성 빈맥이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 심기능을 모니터하고 일반적인 처치를 한다. 필요한 경우에는 수액제를 투여하여 순환되는 혈장량을 증가시켜야 한다. 응급시에는 혈관수축제의 투여를 고려한다.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

자사 포장 단위

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

※ 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해 드립니다.
※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 학술개발부(02-516-6103)로 문의하시기 바랍니다.

TS280-20708



한국유나이티드제약 (주)
충남 연기군 전동면 노장리 404-10

