


페렌탈 정

Perental Tabs.
(Pentoxifylline)



【원료약품 및 그 분량】 1정 중
펜톡시필린(식약청 고시) 400mg

【성 상】
분홍색의 장방형 서방성 당의정

【효능·효과】
1. 뇌순환장애(허혈 및 뇌졸중후증상, 어지러움·두통·건망증 등 뇌동맥경화증 증상)
2. 눈의 혈류순환장애
3. 말초동맥순환장애(간헐성파행, 휴식시 동통, 당뇨병성혈관병증, 위축증, 혈관신경병증)

【용법·용량】
성인 : 펜톡시필린으로서 1회 400mg 1일 2-3회 식후에 소량의 음료와 함께 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 이 약 또는 다른 메틸크산틴계 약물에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 급성 심근경색 환자
 - 대량 출혈 환자(출혈증가의 위험이 있는 환자)
 - 광범위한 망막 출혈 환자(출혈증가의 위험이 있는 환자)
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 중증의 심부정맥 환자
 - 저혈압, 관동맥질환 환자
 - 신기능 장애 환자(크레아티닌 클리어런스 30ml/min이하)
 - 중증의 간기능 장애 환자
 - 항응고제 치료 또는 응고 장애 등에 의해 출혈경향이 증가된 환자
- 부작용
 - 과민증 : 때때로 소양감, 피부붉어짐, 두드러기 등이 그리고 개인에 따라 혈관신경성부종, 기관지 경련, 심지어 쇼크와 같은 중증의 아나필락시스성/아나필락토이드 반응이 나타날 수 있다. 아나팔락시스성/아나팔락토이드 반응이 나타나면 이 약의 투여를 즉시 중단하고 의사에게 알려야 한다.
 - 소화기계 : 때때로 식욕부진, 구역, 구토, 위부불쾌감, 설사, 복부 팽만감, 구갈, 담낭염, 드물게 가슴쓰림, 변비, 복통 등이 나타날 수 있다.
 - 순환기계 : 때때로 호흡곤란, 부종, 드물게 협심통, 혈압강하 등이 나타날 수 있다. 또한 빈맥이 보고되었다.
 - 간장 : 드물게 ALT, AST상승이, 개인에 따라 간장내 담즙울체, transaminase 상승이 나타날 수 있다.
 - 혈액 : 특히 출혈 경향이 증가한 환자에서는 드물게 출혈(피부 및 점막, 위장관에서)이 나타날 수 있으며, 개인에 따라서는 혈소판감소가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
 - 정신신경계 : 드물게 발한, 두통, 어지러움, 불면, 시력불선명 등의 시각장애, 불안, 보행이상, 구음장애, 졸음, 우울 등이 나타날 수 있다.
 - 호흡기계 : 드물게 비출혈, 독감 증상, 비출혈, 후두염 등이 나타날 수 있다.
 - 기타 : 드물게 요폐, 결막염, 암점, 이통, 권태감, BUN상승, 손톱부러짐, 고미, 타액과다, 백혈구감소, 무균성 수막염 등이 나타날 수 있다.
 - 특히 펜톡시필린을 고용량 투여했을 때, 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있다 : 발열, 위압과 같은 위장관 불쾌감, 팽만감, 구역, 구토, 설사 등이 빈번하게 일어나며 때때로 부정맥(예 : 빈맥)이 일어날 수 있다.
- 일반적 주의
 - 뇌동맥경화증에 사용할 때에는 감별진단을 충분히 하여, 진단이 확립된 환자에만 투여한다. 다음 항목을 만족하고, 동시에 뇌의 국소증상을 나타내지 않는 뇌동맥경화에 기인하는 뇌순환장애에 의한다고 판단되는 정신증상 등을 가진 환자에만 투여한다.
 - 연령 : 40세이상
 - 증상 : 두통, 어지러움, 기억력감퇴, 수족의 마비감, 언어장애, 근간장 고조, 보행장애 등
 - 혈압 : 최대혈압 160mmHg 이상 또는 최소혈압 90mmHg 이상의 어느 쪽을 항상 유지
 - 안저동맥 : K. W. II 도 이상
 - 고혈압치료를 받고 있는 환자에 이 약을 투여할 경우에는 정기적으로 전신 혈압모니터를 실시하는 것이 바람직하다.
- 상호작용
 - 항응고제 또는 혈소판응집억제제와 병용투여 또는 단독투여시 출혈, 프로트롬빈시간의 연장이 보고되었다.
 - 인슐린 또는 경구용 혈당강하제의 혈당강하작용을 증강시킬 수 있으므로 당뇨병 치료제를 투여받고 있는 환자의 경우 주의깊게 모니터링한다.
 - 이 약은 고혈압 약물 및 혈압을 낮추는 다른 약물들의 혈압강하작용을 증강시킬 수 있다.
 - 펜톡시필린과 테오필린을 병용투여할 경우 몇몇 환자에서 테오필린의 혈중농도가 증가할 수 있으며 따라서 테오필린에 의한 부작용이 증가하거나 심해질 수 있다.
- 임부·수유부에 대한 투여
 - 임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 모유중으로의 이행이 보고되어 있으므로 수유중인 부인에는 투여를 피한다.
- 소아에 대한 투여
소아에 대한 사용경험은 없다.
- 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여한다.
- 과량투여시의 처치
특별한 해독제는 알려져 있지 않으며 과량을 투여한 경우에는 먼저 독소를 제거함으로써(예 : 위세척) 유효성분이 더 이상 전신으로 흡수되지 않도록 막거나 그 흡수를 지연시킨다. (예 : 활성탄)
- 기타
렛트에 고용량 투여시 양성 유방섬유선종이 나타났다는 보고가 있다.

【저장방법】
기밀용기, 실온 보관

【포장단위】
자사 포장 단위

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처에서 교환해 드립니다.
※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 의약품정보부(02-516-6103)로 문의하시기 바랍니다.

TS667-30630



한국유나이티드제약 (주)
충남 연기군 전동면 노장리 404-10

