

돔페린정

전문의약품

분류번호239

(말레인산돔페리돈)

Dompelin

【원료의약품의 분량】 1정중

말레인산돔페리돈 (비.피) 12.72mg
(돔페리돈으로서 10mg)

【성상】 백색의 원형 정제**【효능·효과】**

하기 질환 및 약제 투여시의 소화불량 증상

즉 오심, 구토, 식욕부진, 복부팽만감, 상복부불쾌감, 복통, 고창, 가슴앓이, 트림 등의 증상에 사용한다.

성인 : 만성위염, 위하수증, 역류성 식도염, 위절제 증후군, 항악성 종양제 또는 L-Dopa제 투여시

소아 : 주기성 구토증, 상기도 감염증, 항악성 종양제 투여시

【용법·용량】

성인 : 1회 1-2정 (L-Dopa 투여시 : 1/2-1정)씩 1일 3회 복용한다.

소아 : 1일 1-2mg/Kg을 1일 3회로 나누어 복용한다.

【사용상의 주의 사항】

1. 다음 환자에는 투여 하지 말 것.

- 1) 이 약에 과민성인 환자
- 2) 위운동의 촉진에 위험한 환자 : 위장관출혈, 기계적 폐색증 또는 천공이 있는 경우
- 3) 프로락틴 분비성 하수체종 환자 (프로락틴선종)
- 4) 경구용 케토나졸을 투여중인 환자 (상호작용항 참조)

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 소아
- 2) 간손상 환자

3. 부작용

- 1) 속 : 매우 드물게 속, 아나필락시스양 증상(발진, 발적, 호흡곤란, 안면부종, 구순부종 등)을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이런 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 조치를 취할 것.
- 2) 내분비계 : 동물실험에서 간뇌의 내분비기능 조절이상에서 유래하는 것으로 추정되는 유선자극, 성주기의 지연 등이, 사람에게서는 드물게 프로락틴의 상승, 여성형 유방, 유방팽만감, 유루증, 무월경증이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우에는 휴약 또는 중지 등의 적절한 처치를 한다.
- 3) 추체외로계 : 영·유아에서 매우 드물게, 성인에서는 예외적으로 추체외로계 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 중지한다. 또, 이러한 증상이 심한 경우에는 항파킨슨제를 투여하는 등 적절한 처치를 한다. 이 부작용은 치료를 중단하면 소실된다.
- 4) 소화기계 : 가끔 설사, 변비, 복통, 복부압박감 드물게 구갈, 가슴앓이, 구역, 구토, 복부팽만감, 일과성 장경련이 나타날 수 있다.
- 5) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
- 6) 정신신경계 : 의식장애, 경련이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 7) 피부 : 매우 드물게 두드러기, 발진과 같은 알레르기 반응이 나타날 수 있다.
- 8) 혈액뇌장벽이 아직 성숙되지 않았거나(유아), 손상된 경우에는 신경계 부작용이 나타날 수 있다.
- 9) 기 타 : 드물게 발한, 졸음, 동요감, 구갈이 나타날 수 있다.

4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 주로 간에서 대사되므로 간손상 환자에게 이 약을 투여할 경우에는 주의해야 한다.
- 2) 중증의 신기능 부전 환자 (혈청 크레아티닌 > 6mg/100ml)의 경우 이 약은 소실 반감기가 7.4시간에서 20.8시간으로 증가되었으나 약물의 혈장농도는 건강지원자에 비해 낮았다. 장기치료를 요하는 환자는 정기적으로 검사를 받아야 한다.
- 3) 필름코팅 정제는 유당을 함유하고 있으며 유당 불내성, 갈락토오스혈증 혹은 포도당/갈락토오스 흡수부전이 있는 환자에는 적절하지 않을 수 있다.
- 4) 이 약은 운전이나 기계조작 능력에 영향을 주지 않거나 무시할 수 있을 정도의 영향이 있다

5. 상호작용

- 1) 다음 약들과 병용시 내분비기능 조절이상 또는 추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 부득이 병용할 경우에는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.
: 페노티아진계 제제 (프로클로로페라진, 클로르프로마진, 디에칠페라진 등), 부티로페논계 제제 (할로페리돌 등), 라우올피아 알칼로이드제제(레세르핀 등)
- 2) 디기탈리스제 포화시의 지표가 되는 구역, 구토, 식욕부진 증상을 은폐하는 수가 있으므로 디기탈리스제 투여중인 환자에게는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.
- 3) 항콜린제와의 병용에 의해 소화관운동 촉진 작용이 억제되어 이 약의 위 배출 작용이 감소되는 수가 있다.
- 4) 이론적으로, 이 약의 위운동촉진 작용은 특히 서방형제제나 장용피제제 같은 경구제의 흡수에 영향을 미칠수 있다. 그러나 이미 디곡신이나 아세트아미노펜에 안정화된 환자의 경우 이 약의 병용투여는 이 약물들의 혈중농도에 아무런 영향도 미치지 않았다.
- 5) 이 약은 신경이완제의 효과를 증가시키지 않는 것으로 알려져 있다.

- 6) 이 약은 중추작용에 대한 영향없이 도파민 효능약(브로모크립틴, 엘-도파)의 소화장애, 구역, 구토와 같은 말초성 부작용을 억제시키는 것으로 알려져 있다.
- 7) 위장관에 대한 이 약의 작용이 항무스카린 약물과 아편양 진통제에 의해 길항될 수 있다.
- 8) 이 약은 주로 CYP3A4에 의해 대사되는데 in vitro의 보고에 의하면 CYP3A4 억제제와 병용투여할 경우 이 약의 혈중농도가 상승함을 보여준다. 건강한 지원자에 대한 경구용 케토코나졸과의 약물 상호작용 연구에서 케토코나졸이 돔페리돈의 CYP3A4 매개 대사를 상당히 저해함이 확인 되었으며, 항정 상태(Steady-state)에서의 돔페리돈의 최고 혈중농도와 혈중농도곡선 하면적(AUC) 이 약 3배까지 증가됨이 관찰되었다.
- CYP3A4 억제제로는 다음과 같은 것들이 있다. : 아졸게 항진균제, 마크로라이드계 항생제, HIV 단백질분해효소 억제제, 네파조돈
 - 돔페리돈 (10mg씩 1일 4회)과 케토코나졸(200mg씩 1일 2회)과의 상호작용 연구에서 약 10-20msec 정도의 QTc 연장이 관찰되었지만 돔페리돈 단독투여에서는 나타나지 않았다. 이 병용 투여에서 관찰된 QTc연장은 완전히 이해되지 않았으며 돔페리돈의 약동학 자료만으로는 설명되지 않는다. 건강한 지원자를 대상으로 한 다른 반복투여 연구에서 돔페리돈을 단독으로 40mg씩 1일 4회 (하루 총 160mg) 투여시 QTc상의 유의한 변화는 관찰되지 않았다. 이 반복투여 연구에서의 돔페리돈의 혈장농도를 돔페리돈-케토코나졸 상호작용 연구에서 병용투여시의 돔페리돈 혈장농도와 유의하였다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
- 1) 임부에의 이 약의 사용에 대한 시판 후 자료는 제한적이다. 랫트를 사용한 동물실험에서 모체에 독성을 나타내는 정도의 고용량에서 생식독성이 관찰되었다. 사람에 대한 잠재적인 위험은 알려져 있지 않다. 따라서 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 2) 이 약은 랫트를 사용한 동물실험에서 모유중으로 이행됨이 관찰되었다. (주로 대사산물로서 배설 : 2.5 mg/kg 용량을 경구및 정맥투여한 후 각각 모유중으로 배설된 최고 농도치가 40ng/ml, 800ng/ml로 나타남) 인체 모유중의 돔페리돈의 농도는 혈장농도의 10-50% 정도이며 10ng/ml를 넘지 않는 것으로 예상된다. 1일 80mg을 투여할 때 인체 모유중으로 이행되는 돔페리돈의 총량은 1일 7mg을 넘지 않을 것으로 예상된다. 신생아에 해를 미치는가에 대해서는 알려져 있지 않다. 따라서 이 약을 복용중인 여성은 수유를 하지 않는 것이 좋다.
7. 소아에 대한 투여
- 소아에게는 과량투여를 피하고 신중히 투여한다. 특히, 1세 이하의 유아에 주의하고 3세 이하의 유·소아 에게는 7일 이상의 연용을 피한다. 이 약은 혈액-뇌관문을 거의 통과하지 않으므로 신경계의 부용을 유발하지 않으나, 혈액-뇌관문이 성숙되지 않은 1세 이하의 유아인 경우에는 신경계 부작용이 나타날 수 있으므로 주의한다.
8. 과량투여
- 과량투여시 졸음, 방향소실이 나타날 수 있으며, 특히 소아의 경우 추체외로 증상이 나타날 수 있다. 항콜린제, 항파킨슨 약물 또는 항콜린 효과를 갖고 있는 항히스타민제가 추체외로 증상을 조절하는데 도움이 될 수 있다. 특별한 해독제는 없으며 필요한 경우 활성탄 투여 및 위세척 등의 보조수단을 행하고 면밀히 관찰한다. 증상은 보통 24시간내에 소실된다.

【포장단위】 자사포장단위

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관 (1~30℃)

※ 본 의약품은 우수약품제조관리기준(KGMP)를 필한 제품입니다. 만약 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질,변폐 또는 오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 개발부로 하여 주시기 바라며, 제품의 변경사항은 당사 홈페이지(www.newgenpharm.com)의 각 제품란에 기재 되오니 참고하시기 바랍니다.
Tel:02-876-7777(대)



생명공학벤처제약기업
(주) 뉴젠팜
서울시 관악구 봉천7동 1596-7

우수약품제조관리기준
KGMP적격지정업체