

톨리손정

전문의약품

분류번호 122

(염산톨페리손)

【원료약품의분량】 1정 중

염산톨페리손 (약전).....150mg

【성 상】 백색의 원형 당의정**【효능·효과】**

1. 근골격계 질환에 수반하는 동통성 근육연축 : 요통, 관절질환, 외상 등
2. 신경계 질환에 의한 근육연축

【용법·용량】

성인 : 염산톨페리손으로서 1회 100-150mg, 1일 3회 경구 투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 1) 이 약에 과민증 환자
 - 2) 중증의 근무력증 환자
 - 3) 3개월 미만의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 약물과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 간장애 환자(간 기능을 약화시킬 수 있다.)
3. 부작용
 - 1) 속 : 드물게 속을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 2) 호흡기계 : 드물게 흉내압박감, 호흡장애가 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
 - 3) 간장 : 드물게 간장애(약물과민성), 간 기능 이상이 나타날 수 있으므로 간 기능 검사를 하는 등 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
 - 4) 과민증 : 때때로 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
 - 5) 정신신경계 : 때때로 휘청거림, 무력감, 권태감, 어지러움, 드물게 두통, 두중감, 졸음등이 나타날 수 있다.
 - 6) 소화기계 : 때때로 식욕부진, 복통, 위·복부불쾌감, 구역, 구토, 설사, 구갈, 드물게 변비, 위·복부팽만감, 위정체감, 가슴쓰림 등이 나타날 수 있다.
 - 7) 기타 : 혈압강하, 드물게 가려움, 하지무력감이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
 - 1) 이 약 투여중에 무력감, 비틀거림, 졸음 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여를 중지한다.
 - 2) 졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
5. 상호작용
 - 1) 메토카르바몰과 병용시 시조절장애가 나타났다는 보고가 있으므로 신중히 투여한다.
 - 2) 골격근이완제(단트롤렌나트륨)와 병용시 근이완작용이 증강될 수 있으므로 신중히 투여한다.
 - 3) 아미노글리코시드계 항생물질과 병용시 신경근차단작용에 의해 호흡억제가 증강될 수 있으므로 신중히 투여한다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 2) 수유부에는 투여를 피하는 것이 바람직하나 부득이하게 투여할 경우에는 수유를 중단한다.
7. 고령자에 대한 투여
일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온보관(1~30℃)**【포장단위】** 자사포장단위

※본 의약품은 우수약품제조관리기준(KGMP)을 필한 제품입니다.
만약 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는
오손된 제품을 구입했을 때에는 구입한 약국이나 병·의원을 통해 교환해
드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 개발부로 문의하여 주시기 바랍니다.
(Tel : 02-876-7777)

**(주) 뉴젠팜**

서울시 관악구 봉천7동 1596-7

우수약품제조관리기준

KGMP적격지정업체