

* 순수 한방 진통제 *

한신리페인캡슐

(작약감초탕)

일반의약품

분류번호:114

※ 이 의약품을 사용하시기 전에 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

한신리페인캡슐은 「상한론(傷寒論)」에 수재된 「작약감초탕(芍藥甘草湯)」을 과학적 제조방법으로 분말화하여 탕제의 약효 그대로 캡슐에 충전한 새로운 제형의 한방제제입니다. 작약감초탕은 혈맥(血脈)을 통순(通順)하고 복통을 고치는 작약(芍藥)과 급박(急迫)을 풀어 주고 동통을 멎게 하는 감초(甘草) 2종의 생약으로 이루어진 처방입니다. 각종평활근 및 골격근의 경련성 동통에 널리 사용할 수 있는 한방진통진경약으로서 사지(四肢)의 동통, 담석·신결석의 산통발작(疝痛發作), 위경련, 신경통, 배뇨통 등에 응용할 수 있습니다.

【원료약품 및 그분량】 1캡슐(550mg)중.

작 약(약전)	1.0g
	(패오니플로린으로서 20.0mg)
감 초(약전)	1.0g
	(글리시리진산으로서 25.0mg)
이상 수침건조 엑스	0.35g

【성 상】 암갈색의 분말이 충전된 상.하부 하늘색의 캡슐제.

【효능/효과】 급격하게 일어나는 근육의 경련을 수반하는 통증.

【용법/용량】 보통성인 1일 3회, 1회 2캡슐씩 식전 또는 식간에 복용.

【사용상의 주의사항】

1. 금기.

1) 심장병의 병력이 있는 환자(증상이 나타나면 투여를 중지하고 연용하지 않는다).

2. 부작용.

1) 심장 : 율혈성 심부전, 심실빈박으로 인한 전신피로, 심계항진, 숨이 참, 흉부불쾌감, 가슴쓰림, 어지러움, 실신과 같은 중증의 증상이 일어날 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사의 진료를 받는다.

3. 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 혈압이 높은 환자 또는 고령자
- 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자
- 3) 부종이 있는 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

1) 본제의 복용에 의해 뇨량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.

2) 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.

3) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.

5. 일반적 주의.

1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.

6. 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.

칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.

7. 저장상의 주의.

1) 직사광선을 피하고 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.(사용후 반드시 밀폐 보관할 것)

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 할 것.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.

【저장방법/사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 / 제조일로부터 36개월.

【포장단위】 1캡슐(550mg)×180캡슐

*본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는
오손된 제품은 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.



주식
회사

한 국 신 약

본사/공장 : 충남 논산시 양촌면 중산리 805-15 TEL : (041)740-2345
<http://www.hsp.co.kr>

08052004