이담 · 소화의 이중작용

파베라®정

아리벤돌

전문의약품

239

파베라®는 프랑스 Bouchara사에서 최근 개발한 이담 · 진경제로서 간 · 담도에 특이적으로 작용하여 담즙의 생성, 분비를 촉진하고 오디괄약근의 경련을 억제 하므로 소화불량, 구역, 구토, 변비 등의 증상을 치료합니다.

원료약품 및 그분량

1정 중

아리벤돌 (별규) ····· 100mg

성 상

분홍색의 원형 당의정

약리작용 및 특징

1. 담즙분비 조절작용

파베라®는 담즙분비를 증가시켜 지방질의 소화흡수를 촉진하며 따라서 다른 영양소의 소화흡수도 촉진합니다. 또한 증가된 담즙산은 장운동을 촉진하여 변비증상을 개선합니다.

2. 항경련작용

파베라®는 항경련작용이 있어서 위, 장관의 긴장으로 인한 경련과 통증을 제거합니다.

3. 광범위한 효과

파베라®는 단순 소화불량뿐 아니라 간경변, 감석증, 담낭절제증후군, 담낭운동장애, 바이러스성 간염 등에 의해 유발된 소화불량에도 효과가 우수합니다.

4. 탁월한 내약성

파베라®는 경구투여후 신속히 흡수되어 작용을 나타내며 내약성이 뛰어납니다.

효능 · 효과

1. 주 효능 · 효과

소화불량, 구역, 구토, 변비 등의 증상치료

용법 · 용량

성인 : 아리벤돌로 1일 300~400mg(본제 3~4정)을 3~4회 분할하여 식전 및 취침시 경구 복용합니다. 연령,증상에 따라 적절히 증감하십시오.

사용상의 주의사항

1. 일반적 주의

1) 다른 약물을 투여하고 있는 경우에는 투여하기 전에 약사 또는 의사와 상의하십시오.

2) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

2. 소아에 투여

이 약은 7세 미만의 영 · 유아에게 경구투여하지 마십시오.

3. 저장상의 주의사항

1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법

밀폐용기

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 대한 의문사항은 마케팅부로(Tel:959-3679) 문의하시기 바랍니다.

※ PBT 950325
632302-4-1

한화제약(주)

본사 : 서울특별시 성북구 석관 2동 261
공장 : 경기도 용인시 양지면 남곡리 472

원료공급 · 기술제공
Laboratoires du Docteur E. BOUCHARA
France