위 · 장관기능 조절제

메리틴 정 100mg 200mg

(말레인산트리메부틴)

분류번호:239
일반의약품

Meritin Tab.

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며, 제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

고도로 복잡해진 사회생활로 인하여 정신적 스트레스를 받게 되면 자율신경실조를 일으켜 위 · 장관의 정상적인 운동을 방해하고 이상경련을 일으켜 과민성을 띠기 쉽습니다. **메리틴**은 이같이 소화관운동기능이상 때문에 생기는 소화불량 및 기능적 결장질환에 우선적으로 선택되어질 수 있는 약제로서 종래의 치료제인 항콜린제에서 나타나는 이상반응(위액분비감소, 목마름, 산동, 시야장애, 서맥 등)이 거의 없이 안심하고 사용할 수 있으며 과도하게 기능이 억제되거나 자극을 받은 위 · 장관에 양면적으로 작용하여 그 기능을 정상화시키는 위 · 장관기능 조절제입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

말레인산트리메부틴(고시)·····100, 200mg

· 유당 〈기원 : 소, 사용부위 : 우유〉

【내 용 량】

· **메리틴정 100mg 100정 :** 180mg × 100정(총 중량 18g)
· **메리틴정 100mg 1000정 :** 180mg × 1000정(총 중량 180g)
· **메리틴정 200mg 100정 :** 300mg × 100정(총 중량 30g)

【성 상】 백색의 원형정제

【약리작용 및 특장】

1. 위 · 장관운동의 양면 조절 작용

소화관 내부의 신경계(Meissner's Auerbach 신경총)에 선택적으로 작용하여 과도하게 항진되거나 또는 억제된 기능을 조절하는 양면작용으로 기능적소화불량 및 과민성 대장증후군에 효과를 나타낸다. 반면 종래의 치료제는 자율신경과 소화관 외부의 신경에 작용하여 소화관운동을 억제 또는 촉진시키는 일면성만 있었다.

2. 연동운동 촉진작용

연동수축파를 부활강화시켜 위 · 십이지장의 연동운동을 촉진시키므로 구역, 구토 등을 개선시킨다.

3. 진경작용 및 국소마취작용

파파베린의 10배에 해당하는 진경작용 및 리도카인과 동등한 국소마취력을 나타내므로 위의 경련, 통증을 해소시킨다.

4. 낮은 이상반응과 높은 안전성

메리틴은 항콜린작용이 없으므로 위액분비감소, 변비, 목마름, 산동, 시야장애, 맥박이 느려지는 등의 전신이상반응이 거의 없으며 고질적인 위장병환자에게 특히 유 · 소아 및 노인에게도 안심하고 투여할 수 있다.

대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공장:강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308
http://www.dhpharm.co.kr

우수의약품제조관리기준
KGMP적격업소제품

【효능 · 효과】

1. 주효능 효과
   1) 식도 역류 및 열공헤르니아, 위 · 십이지장염, 위 · 십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상 (배아픔, 소화불량, 구역, 구토)
   2) 과민성 대장증후군 및 경련성 결장
   3) 소아질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관통과장애(변비, 설사), 동요자극, 수면장애

   〈다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다.〉

【용법 · 용량】

성인 : 말레인산트리메부틴으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 이상반응
   1) 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명, 구역, 구토, 소화장애, 목마름, 입안마비감 등이 나타날 수 있다.
   2) 순환기계 : 드물게 심계항진이 나타날 수 있다.
   3) 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기, 권태감, 두통 등이 나타날 수 있다.
   4) 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.
   5) 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
2. 임부에 대한 투여

   임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
3. 수유부에 대한 투여

   수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

· 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
· 제품을 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래 용기에 넣어 보관할 것.

【포장단위】

· **메리틴 100mg :** 100, 1000정
· **메리틴 200mg :** 100정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 "의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품 입니다. 만약 구입시 사용(유효) 기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2004년 08월 03일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부 (02:586-6451)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일 : 2004년 08월 03일