순환기장애예방 · 개선

쎄레톱-C 연질캡슐

분류번호:219
일반의약품

Seletop-C Soft Cap.

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며, 제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

쎄레톱-C 연질캡슐은 정상적 건강생활에 필수적인 미량 미네랄 원소인 셀레늄과 고단위의 비타민 E 및 A · C를 이상적으로 배합처방한 연질캡슐제로서 생체기능의 저항력을 증진시키며 심질환, 고혈압, 감염성질환, 시력질환 등 각종 성인병의 개선제입니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

셀레늄 함유 건조효모(고시)·····92.6mg
(셀레늄으로서 50㎍)
초산토코페롤(약전)·····400 I.U
아스코르빈산(약전)·····500mg
팔미틴산레티놀(약전)·····5000 I.U
파라옥시안식향산메칠(약전)·····0.27mg
파라옥시안식향산프로필(약전)·····0.14mg

· 연질캡슐: 호박산 젤라틴 〈기원: 소, 사용부위: 가죽〉

【내 용 량】

· **쎄레톱-C 50연질캡슐 :** 1,576mg×50연질캡슐(총 중량 78.8g)
· **쎄레톱-C 100연질캡슐 :** 1,576mg×100연질캡슐(총 중량 157.6g)

【성 상】 담갈색의 내용물이든 일면 암록색 일면 암갈색의 연질캡슐

【효능 · 효과】 심질환, 감염성 질환, 고혈압, 시력질환에 의한 여러 증상의 개선, 비타민 A 및 C의 보급
〈다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다.〉

【용법 · 용량】 성인 1일 1회 1캡슐을 식후에 복용한다.

【저장방법】 기밀용기

【포장단위】 50, 100캡슐

【사용기간】 제조일로부터 24개월

대화제약주식회사
서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공장:강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308
http://www.dhpharm.co.kr

우수의약품제조관리기준
KGMP적격업소제품

【사용상의 주의사항】

1. 경고
   임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 10,000 I.U. 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 50,000 I.U./일 이상 투여하지 않는다.(비타민 A결핍증 환자는 제외)
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   구성성분에 과민증 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
   2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
4. 이상반응
   1) 소화기계 : 구역, 구토, 설사, 배가 거북함, 변비 등이 나타날 수 있다.
   2) 피부 : 발진, 발적, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종 등이 나타날 수 있다.
   3) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수도 있다.
   출혈이 오래 지속될 경우에는 약사 또는 의사와 상의한다.
   4) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자에 비타민 E를 투여할 경우에는 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
5. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
   2) 이 약의 투여에 의해 이상반응이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
   3) 성인의 1일 셀레늄 필요량은 70-150㎍이고, 200㎍ 이상 투여하면 독성이 나타날 수 있으므로 200㎍이상 투여하지 않는다.
6. 임부에 대한 투여
   외국에서 임신전 3개월로부터 임신 초기 3개월 까지 비타민 A를 10,000 I.U./일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경릉 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 보고되어 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신을 희망하는 부인에 투여할 경우는 용법 · 용량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 I.U./일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울인다.
7. 임상검사치에의 영향
   각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
8. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

※ 본 제품은 "의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품 입니다. 만약 구입시 사용(유효) 기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 개정일자(2004. 08. 03) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부(02:586-6451)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일: 2004년 08월 03일