

소화불량, 가스제거 디제스탈 정

분류번호: 233

일반의약품

Dizestal Tab.

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며,
제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

판크레아틴(별규).....175mg
(아밀라제.....4200F.I.P 단위)
(리파제.....5367F.I.P 단위)
(프로테아제.....222F.I.P 단위)

•기원 : 돼지 •사용 : 췌장

디메치콘(N.F).....25mg
우담즙엑스(식약청고시).....25mg
(콜린산으로서.....11.3mg)

•기원 : 소 •사용 : 담즙

헤미셀룰라제(별규).....50mg
(125 헤미셀룰라제 단위)

•유 당 <기원 : 소 사용 : 우유>

•젤라틴 <기원 : 소 사용 : 가죽>

【내용량】

- 디제스탈 20정 : 700mg × 20정(총 중량 14g)
- 디제스탈 100정 : 700mg × 100정(총 중량 70g)
- 디제스탈 400정 : 700mg × 400정(총 중량 280g)
- 디제스탈 500정 : 700mg × 500정(총 중량 350g)

【성 상】 장방형의 장용피를 한 녹색 당의정

【효능 · 효과】

소화불량, 식욕감퇴(입맛없음), 과식, 체함(위체), 소화촉진,
소화불량으로 인한 위부팽만감, 방사선 검사전의 가스제거
<다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다.>

【용법 · 용량】

성인 1회 1-2정을 1일 3회 식후에 복용합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
(1) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
(2) 이 약은 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로
이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
에는 신중히 투여한다.
2. 일반적 주의
(1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킨다.
(2) 2주 정도 투여하여도 증상 개선이 없을 경우에는
투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의한다.
3. 소아에 대한 투여
이 약은 7세 미만의 영 · 유아에게 투여하지 않는다.
4. 저장상의 주의사항
(1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
(2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한
곳에 밀전하여 보관한다.
(3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바
꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 20, 100, 400, 500정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 “의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)”에 따
라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시
사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된
제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여
드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2006년
08월 24일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약
개발부(080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일 : 2006년 08월 24일



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공장:강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308
<http://www.dhpharm.co.kr>

우수의약품제조관리기준

KGMP적격업소제품