

비스테로이드성 소염·진통제

디크로닉정

(클로닉신리신)

125mg

250mg

분류번호:114

일반의약품

Diclonic Tab. 125mg, 250mg

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바랍니다, 제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
클로닉신리신(식약청고시).....125mg, 250mg
· 첨가제(동물유래): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
· 첨가제(타르산소): 청색 1호, 청색 2호, 황색 5호

【성 상】

- 디크로닉 정 125mg: 하늘색의 원형제표정
- 디크로닉 정 250mg: 청색의 원형제표정

【내용량】

- 디크로닉 정 125mg: < 10정(총 중량 2.919g)>
100정(291.9mg×100정(총 중량 29.19g))
200정(291.9mg×200정(총 중량 58.38g))
500정(291.9mg×500정(총 중량 145.95g))
- 디크로닉 정 250mg: < 100정(454mg×100정(총 중량 45.4g))

【효능·효과】

류마티관 관절염, 근육통, 신경통, 외상후·수술후 통증, 두통, 귀의 통증, 치통, 월경통
(다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다.)

【용법·용량】

성인: 클로닉신리신으로서 1회 125-250mg 1일 3회 경구투여한다.
연령·증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

- 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
- 심혈관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 중대한 심혈관계 혈전 반응, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 투여 기간에 따라 이러한 위험이 증가될 수 있다. 심혈관계 질환 또는 심혈관계 질환의 위험 인자가 있는 환자에서는 더 위험할 수 있다. 의사와 환자는 이러한 심혈관계 증상의 나타남에 대하여 신중히 모니터링하여야 하며, 이는 심혈관계 질환의 병력이 없는 경우에도 마찬가지로 적절하다. 환자는 중대한 심혈관계 독성의 징후 및/또는 증상 및 이러한 증상이 나타나는 경우 취할 조치에 대하여 사전에 알고 있어야 한다.
- 위장관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 위 또는 장관의 출혈, 궤양 및 뚝림을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 결코 증상 없이 발생할 수 있다. 고령자는 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 클 수 있다. 투여 기간이 길어질수록 중대한 위장관계 이상반응의 발생 가능성이 증가될 수 있으나 단기 투여시 이러한 위험이 완전히 배제되는 것은 아니다. 이 약을 투여하는 동안 위장관계 궤양 또는 출혈의 증상 및 징후에 대하여 신중히 모니터링 하여야 하며, 중증의 위장관계 이상반응이 의심되는

경우 즉시 추가적인 평가 및 치료를 실시하여야 한다. 비스테로이드성 소염진통제는 중증의 위장관계 이상반응이 완전히 배제될 때까지 투여 중단하는 것도 치료법이 될 수 있다. 고위험군의 환자에게는 비스테로이드성 소염진통제와 관련 없는 다른 대체 치료제를 고려하여야 한다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 소화성궤양 환자
- 약물에 기인하여 위·십이지장에 동요 나타날시
- 이 약의 성분과 과민증이 있는 환자
- 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 저해제 포함)에 대하여 천식, 두드러기 또는 알레르기 반응 병력이 있는 환자(이러한 환자에서 비스테로이드성 소염진통제 투여후 치명적인 중증의 아나필락시양 반응이 드물게 보고되었다.)
- 관상동맥 우회로술(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료
- 입부
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
소화성궤양의 병력이 있는 환자
- 이상반응
 - 소화기계: 장기투여시 위장관계에 대한 이상반응 특히 위장출혈, 소화성궤양 및 뚝림이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 기타: 때때로 구역, 구토, 헛기름, 졸음, 두통, 식욕 감소, 다형성이 나타날 수 있다.

5. 일반적 주의

- 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 한다. 이 약은 각 환자의 치료 목적과 일치하도록 가능한 최단 기간동안 최소 유효용량으로 투여한다.
- 소염진통제에 의한 치료는 원인이 아닌 대증요법일에 유의한다.
- 만성질환에 사용되는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - 이 약을 장기간 투여하는 환자는 정기적으로 임상검사(노검사, 전혈구 검사(CBC) 및 화학혈액 검사 등) 할 때 검사, 간기능 검사 등을 실시하고 이상이 인정된 경우에는 줄이거나 중지하는 등의 적절한 조치를 한다. 간질환 또는 신질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구 증가증, 발진)가 나타나거나 비정상적인 간기능 검사 또는 신기능 검사 결과가 지속되거나 악화되면, 이 약의 투여를 중단해야 한다.
 - 약물요법 이외의 치료법도 고려한다.
- 금성질환에 사용되는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - 금성질환, 통증 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.
 - 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피한다.
 - 원인요법이 있으면 그것을 실시한다.
- 환자의 상태를 충분히 관찰하고 이상반응의 나타남에 유의한다.
 - 이 약의 약화적 특성상 열증의 다른 증상과 징후를 불완전하게 통증 및 비감염성 조건하에서 감염성 합병증의 진단을 지연시킬 수 있다. 이 약을 간염에 의한 열증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 함께 복용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여한다.
- 위장관계 이상반응: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 계량성 질환 또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자에게 처방시 극심한 주의를 기울여야 한다.

소화성 궤양 질환 및/또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자의 경우 이러한 위험인자가 없는 환자에 비해 비스테로이드성 소염진통제 투여시 위장관 출혈의 발생 위험이 10배 이상 증가하였다. 위장관계 출혈을 증가시키는 다른 위험인자는 경구용 코르티코스테로이드 또는 항응고제 함께 복용, 비스테로이드성 소염진통제의 장기 사용, 알콜 섭취, 고령, 허약한 건강상태 등이 있다. 치명적인 위장관계 이상반응에 대한 자발적 보고의 대부분은 고령자 및 허약자에 대한 것이므로 이러한 환자에게 이 약을 투여시 특별히 주의하여야 한다.

- 고혈압: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계 위해사태의 발생률이 증가될 수 있다. 치아치에 이뇨제 또는 루프형 이뇨제를 복용중인 환자가 비스테로이드성 소염진통제 복용시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압 환자에서 신중히 투여해야 한다. 이 약의 투여 초기와 투여기간 동안에 혈압을 면밀히 모니터링해야 한다.
- 신장기능: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 복용하는 일부 환자에서 체액 저류 및 부종이 관찰되었다. 이 약은 체액저류 또는 신부전인 있는 환자에서 신중히 투여해야 한다.
- 골다공증: 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 복용시 신장유두괴사나 기타 신장 손상이 일어날 수 있다. 또한, 신혈류를 유지하는데 프로스타글란딘의 역할이 중요하므로, 신부전 환자, 신기능 부전 환자, 간기능 부전 환자, 이뇨제나 ACE 저해제 투여 중인 환자, 고령자 등에서는 특별한 주의가 필요하다. 투약을 중단하면 대부분 치료 전 상태로 회복된다.
- 진행된 신질환: 진행된 신질환 환자에서 이 약 사용에 대한 통제된 임상 시험은 실시된 바 없다. 따라서, 진행된 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 방지되지 않는다. 이 약의 투여를 개시해야 한다면, 환자의 신장 기능을 대해서 면밀히 관찰해야 한다.
- 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 간기능 수치 상승이 나타날 수 있다. 이러한 비정상적인 검사수치는 치료가 지속됨에 따라 악화되거나 변화가 없거나 또는 일시적일 수 있다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로, 황달, 치명적 전격성 간염, 간괴사, 간부전(일부는 치명적임)을 포함한 중증의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었다. 간기능 이상을 암시하는 증상 및/또는 징후가 있는 환자 또는 간기능 시험 결과 비정상인 환자에 있어서는 투여기간 동안 주의깊게 간기능의 악화 여부를 관찰하고 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구 증가증, 발진)가 나타나는 경우에는 이 약의 투여를 중지한다.
- 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 빈혈이 나타날 수 있으므로 이 약의 장기 투여에 의해 빈혈의 증상 또는 징후가 나타나는 경우에는 헤모글로빈치 또는 헤마토크리트치 검사를 해야 한다. 비스테로이드성 소염진통제는 철소과 응집을 억제하며, 일부 환자에서는 출혈 시간을 연장시키는 것이 확인되었다. 아스피린과 달리 이 약의 철소과 기능에 대한 영향은 상대적으로 작고 지속기간이 짧으며 가역적이다. 응고 관련 질환이 있거나 항응고제를 투여하고 있는 경우와 같이 철소과 기능 변경에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 환자는 이 약 투여시 신중히 모니터링 하여야 한다.
- 아나필락시양 반응: 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 아나필락시양 반응은 약물로 노출된 경향이 없는 환자에서도 일어날 수 있다. 이러한 발한 증상은 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 비특수 풀림을 동반하거나 동반하지 않거나 또는 잠재적으로 치명적인 중증의 기관지 경련을 나타내는 천식 환자에서 전형적으로 발생한다. 이러한 아나필락시양 반응이 나타나지는 경우 응급치료를 실시하여야 한다.
- 피부반응: 이 약은 탈락성 피부염, 스티븐스-존슨 증후군 및 독성 표피괴사 같은 중대한 피부 이상반응을 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이들 중대한 이상반응은 결코 증상 없이 발생할 수 있다. 대부분의 경우 이러한 이상반응은 투여 초기 1개월 이내에 발생한다. 환자는 중대한 피부 나타날 증상 및 증후에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진 또는 다른 과민 반응의 최초 증상 및 징후가 나타날 때 약을 투여를 중단해야 한다.
- 천식 환자 중 일부는 아스피린에 민감하게 반응할 수 있다. 아스피린 민감성 환자 환자에게 아스피린을 사용하는 경우 치명적일 수 있는 중증의 기관지 경련과 관련될 수 있다. 이러한 아스피린 민감성 환자에게는 아스피린과 다른 비스테로이드성 소염진통제의 기관지경련을 포함하는 교차반응이 보고되었다. 그러므로 이 약은 이러한 아스피린 민감성 환자에게는 투여하지 않도록 하며, 천식 환자에게는 주의깊게 사용해야 한다.
- 이 약은 코르티코이드 대체를 대체하거나 코르티코이드 결핍증을 치료하기 위한 약물로 사용될 수 없다. 코르티코스테로이드의 갑작스러운 투여 중단은

코르티코스테로이드-반응성 질환의 악화를 초래할 수 있다. 장기간 코르티코스테로이드를 복용해 온 환자에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 한다.

6. 상호작용

- 다른 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)와 병용할 경우 이상반응의 위험이 증가할 수 있으므로 병용하지 않는다.
- ACE 저해제: 비스테로이드성 소염진통제에 의해 ACE 저해제의 항고혈압 효과가 감소될 수 있다는 보고가 있으므로 이 약과 ACE 저해제를 함께 투여하는 경우 이러한 상호작용을 염두에 두어야 한다.
- 아스피린: 아스피린과의 함께 복용이 비스테로이드성 소염진통제의 사용과 관련된 중대한 심혈관계 혈전반응의 위험을 감소시킬 수 있다는 일관된 증거는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 이 약과 아스피린의 함께 복용에 의해 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가될 수 있으므로 두 약물의 함께 복용은 일반적으로 권장되지 않는다.
- 프로세미드: 임상시험 및 시판후 조사 결과 이 약의 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 일부 환자에서 프로세미드 및 치아치에 이뇨제의 나트륨노배설 효과가 감소될 수 있음이 확인되었다. 이들 약물과 비스테로이드성 소염진통제를 함께 투여하는 동안 신부전 징후를 면밀히 관찰해야 한다.
- 리튬: 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프로스타글란딘 합성 억제에 의해 혈청 리튬 농도를 증가시키고 리튬의 신클리어런스를 감소시킬 수 있다. 따라서 비스테로이드성 소염진통제와 리튬의 함께 투여 시 리튬의 독성 징후를 주의깊게 관찰해야 한다.
- 메토트렉세이트: 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)와 병용투여시 신세포에서 메토트렉세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메토트렉세이트의 혈혈학적 독성이 증가될 수 있으므로 항암요법으로 사용되는 고용량의 메토트렉세이트와는 병용 투여하지 않으며, 저용량의 메토트렉세이트와 병용투여시 신중히 투여되어야 한다.
- 와파린: 위장관계 출혈에 대하여 와파린과 비스테로이드성 소염진통제는 상승작용을 나타낼 수 있으므로 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단독으로 투여하는 경우에 비해 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있다.
- 이 약은 혈액응고에 영향을 주지 않으므로 혈액응고와 관련한 용량조절은 필요하지 않다.
- 입부에 대한 투여
 - 이 약을 입부에 투여한 임상자료는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 입심 말기에 이 약을 투여 시 태아의 동맥관을 조기 폐쇄시킬 수 있다.
 - 궤도에 대한 실험에서 비스테로이드성 소염진통제는 프로스타글란딘 합성을 저해하는 다른 약물과 마찬가지로 난산의 발생 빈도를 증가시키고, 분만을 지연시키며 새끼의 생존율을 감소시켰다.
- 수유부에 대한 투여
 - 이 약이 사람의 모유로 분비되는지는 알려져 있지 않다. 그러나 많은 약물들이 모유 중으로 이행될 뿐만 아니라 이행될 경우 영아에서 심각한 이상반응의 발생이 우려되므로, 수유부에 대한 약물 투여의 중요성을 고려하여 수유를 중단하거나 약을 투여를 중단해야 한다.
- 술아 및 고령자에 대한 투여
 - 고령자 및 술아에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 이상반응의 나타남에 특히 유의한다.
- 보관 및 취급상의 주의사항
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

- 디크로닉정 125mg: 10, 100, 200, 500정
- 디크로닉정 250mg: 100정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 '의약품 제조 및 품질관리기준(GMP)'에 따라 제조 및 품질관리를 한 의약품입니다. 그러나 구입시 사용유기기간이 경과하였거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 기타 자세한 사항은 첨부문서의 작성일자(2008년 02월 27일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부(080-855-0140)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일: 2008년 02월 27일



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남원동 1056-16호
공정·강동동 황성로 33호 308

http://www.dhpharm.co.kr

우수의약품제조관리기준

KGMP적격업소제품