간장보호와 간질환 치료제

비디카정

(비페닐디메칠디카르복실레이트)

분류번호:391
전문의약품

Bidica Tab.

간장(Liver)은 각종물질의 합성. 대사. 해독. 담즙분비 등 생명유지에 필수적인 중요한 생체기능을 담당하는 장기이므로 간기능에 이상이 생기면 신체에 심각한 이상을 초래할 수 있습니다. 대부분의 간질환은 발병초기에는 무증상으로 서서히 발병하다가 일단 증상(피로감, 식욕부진, 오심, 무력감 등)이 나타나면 이미 심각하게 진전된 상태여서 치료에 어려움이 있습니다. 간질환이 발생하여 간세포가 파괴되면 간세포내에 존재하던 효소(GOT.GPT)가 혈액으로 유출되는데 이 효소 수치를 측정함으로써 간질환을 진단할 수 있습니다.

비디카정은 간장약으로 사용되어오던 오미자에서 유효성분을 분리하여 약효를 더욱 강화시킨 간장보호 및 간염 치료제로서 오미자는 신농본초경에 로상, 허로, 구역, 반위, 수복, 주독 등에 대한 효과가 수재되어 있습니다.

비디카정은 중국의학과학원 약물연구소에서 만성간염치료제로 연구개발되었으며 파괴된 간세포를 치료하여 ALT수치를 정상화시켜줍니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

비페닐디메칠디카르복실레이트(별규)·····25mg

·유당 〈기원 : 소, 사용 : 우유〉

【성　　상】 백색의 장방형 정제

【효능 · 효과】

지속적으로 ALT가 상승되어 있는 만성간염 및 약물로 인해 트란스아미나제(Transaminase)가 상승된 간염

【용법 · 용량】

성인 : 비페닐디메칠디카르복실레이트로서 1회 25-50mg, 1일 3회 경구투여한다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 만성 활동성 간염 환자
   2) 간경변 환자
2. 이상반응
   1) 입안마름, 메스꺼움, 피부발진이 일어날 수 있으며, 이러한 이상반응은 항과민약을 병용투여하면 소실된다.
   2) 일과성 황달이 나타날 경우도 있으나 투약을 중지하거나 황달 치료제를 병용 투여하면 소실된다.
   3) 드물게 구역과 복부팽만이 발생할 수도 있으나 곧 소실된다.
3. 상호작용

   이노신(Inosine)과 함께 투여시에, 재발한 ALT의 상승이 개선될 수 있다.
4. 임부 및 수유부에 대한 투여

   임부 및 수유부에는 투여하지 않는다.

대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호

공장:경기도 시흥시 정왕동 시화공단1라603

http://www.dhpharm.co.kr

우수의약품제조관리기준

KGMP적격업소제품

5. 소아에 대한 투여
   소아에는 용량을 감소시켜 투여한다.
6. 고령자에 대한 투여
   일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
7. 임상검사치에의 영향
   치료 중에 다시 ALT가 상승하는 환자는 거의 없다. 투여 중지 후에 ALT는 증가할 수 있으나 이 약의 재투여로 개선된다.
8. 보관 및 취급상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법】 차광기밀용기

【포장단위】 60, 120, 1000정

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품 입니다. 만약 구입시 사용(유효) 기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2004년 04월 14일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부(02:586-6451)로 문의하시기 바랍니다.

설명서 개정일 : 2004년 04월 14일