먹는 치질 전문치료제

후바후바정

분류번호:256
일반의약품

Fuvafuva Tab.

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며, 제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

치질이란? 항문주위에 다량 분포되어 있는 정맥이 여러가지 원인으로 인해 정맥류(靜脈瘤 : 정맥벽은 얇은 근육이나 탄력조직으로 구성되어 있는데 정맥혈관내의 압력이 상승함에 따라 국소적으로 정맥벽이 늘어나면서 구불구불해지고 팽대된 현상)가 형성되어 통증, 가려움, 따끔거림, 부종, 출혈, 세균감염을 동반한 염증 등의 증상을 수반하는 항문질환입니다.
이러한 치질은 변비로 인한 정맥의 압박폐쇄나 나이가 많아지거나 오랜시간의 좌식생활로 정맥혈류의 순환부전으로 인한 정맥혈류의 정체로 많이 발생됩니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

은행엽엑스(식약청고시)……14mg
(총 깅고플라본배당체로서 3.4mg)
트록세루틴(식약청고시)……300mg
염산헵타미놀(식약청고시)……300mg
· 유당 〈기원 : 소, 사용 : 우유〉

【내 용 량】

· **후바후바정 100정 :** 820mg×100정(총 중량 82g)
· **후바후바정 120정 :** 820mg×120정(총 중량 98.4g)

【성 상】 녹색의 막대형 필름코팅정

【효능 · 효과】

정맥류로 인한 다음 증상 : 하지중압감, 정맥염
치핵과 관련된 여러증상
〈다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다.〉

【용법 · 용량】

1. 정맥질환 : 1회 1정, 1일 2회(아침, 저녁) 식사 중 경구투여한다.
2. 치질증상 : 1회 1정, 1일 3~4회 식사 중에 투여한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 갑상선기능항진증 환자
   2) MAO저해제를 투여받고 있는 환자
   3) 악성 고혈압 환자
   4) 중증 빈맥 환자
   5) 이 약은 황색4호(타르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
2. 이상반응
   1) 은행엽 엑스로 인한 이상반응:
      매우 드물게 알레르기성 피부반응, 두통, 위장관질환 등이 나타날 수 있다.
   2) 헵타미놀로 인한 이상반응:
      발적, 드물게 맥박의 빨라짐이 나타날 수 있다.

3. 일반적 주의

1) 염산 헵타미놀이 함유되어 있으므로 중증의 동맥성 고혈압 환자에 투여할 경우에는 동맥압을 신중히 관찰한다.
2) 급성 치질 환자에게 사용하며 다른 항문질환에 까지 효과가 나타나는 것은 아님을 주의한다.
증상이 신속히 개선되지 않는 경우에는 항문과 전문의의 진료를 받은 후 치료를 수정한다.
3) 염산 헵타미놀은 이 약을 사용하는 운동선수에게 도핑테스트에서 양성반응이 나타날 수 있으므로 주의한다.
4) 정해진 용법,용량을 잘 지킨다.
5) 1개월간 투여하여도 증상의 개선이 나타나지 않을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
6) 소아에는 투여하지 않는다.

4. 상호작용

이 약은 염산 헵타미놀을 함유하므로 MAO저해제와 병용투여시 혈압상승이 나타날 수 있다.

5. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물실험에서 기형발생은 나타나지 않았다. 사람의 경우에도 임신 첫 3개월까지의 조사에서 위험도가 알려져 있지 않으며, 어떤 기형유발효과도 특별히 발견되지 않았다.
2) 모유로 이행한다는 보고는 없으나 수유기간동안 사용하지 않는다.

6. 과량투여시의 처치

과량 또는 고의에 의하여 이 약을 과량투여하는 경우에는 동맥압 및 심장박동을 잘 관찰하십시오.

7. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 100, 120, 500정

※ 본 제품은 "의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품 입니다. 만약 구입시 사용(유효) 기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2004년 09월 20일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부 (02:586-6451)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일 : 2004년 09월 20일

대화제약주식회사
서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공장:강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308
http://www.dhpharm.co.kr

우수의약품제조관리기준
KGMP적격업소제품