비스테로이드성 소염 진통제

탈마 정

탈니플루메이트

분류번호:114
전문의약품

Talma Tab.

【원료약품의 분량】 1정 중

탈니플루메이트(고시)……370mg

【성　　상】 황색의 원형 필름코팅정

【작용 및 특장】

1. 작용기전
   탈마정은 염증과정에서 중요한 역활을 하는 Prostaglandin, 특히 PGE와 PGF의 형성을 억제함으로서 염증의 진행과정을 차단합니다.
2. 우수한 항염효과
   탈마정은 Phenylbutazone, Aspirin, Indomethacin, Diflunisal보다 항염효과가 우수합니다.
3. 강력한 진통효과
   탈마정은 Niflumic acid, Piroxicam, Sulindac, Diflunisal보다 진통효과가 1.5배 우수합니다.
4. 뛰어난 내성
   탈마정은 고용량에서도 위점막에 아무런 변화를 일으키지 않아 위장관에 대한 부작용이 거의 없습니다.

【효능 · 효과】

1. 다음 질환에 사용할 수 있다.
   류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 좌골신경통, 무월경성 동통, 외상후 동통, 수술후 염증 및 동통, 건초염, 염좌, 자궁부속기염, 인두염, 편두염, 이염, 부비동염

【용법 · 용량】

성인 : 탈니플루메이트로서 1회 370mg을 1일 3회 경구투여한다. 중증일 경우에는 1회 740mg을 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
   1) 이 약에 과민증 환자.
   2) 소화성궤양 또는 그 병력이 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
   1) 간장애 환자
   2) 신장애 환자
3. 경고
   매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

대화제약주식회사
서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공장:강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308
http://www.dhpharm.co.kr

우수의약품제조관리기준
KGMP적격업소제품

4. 부작용
   1) 과민증: 일반적으로 내성이 좋으나 과민증 환자는 구역, 구토가 일어날 수 있다.
   2) 소화기: 장기투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장출혈, 소화성궤양 및 천공이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
   1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의한다.
   2) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
      (1) 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사 (요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 한다.
      (2) 약물요법이외의 치료법도 고려한다.
   3) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
      (1) 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.
      (2) 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피한다.
      (3) 원인요법이 있으면 그것을 실시한다.
   4) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의한다.
   5) 감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여한다.
   6) 다른 소염진통제와 병용투여는 피하는 것이 바람직하다.
   7) 고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의한다.
6. 상호작용
   쿠마린계 항응혈제(와르파린 등) 와 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.
7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여
   1) 임부, 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.
   2) 어린이 용량은 설정되어 있지 않으므로 12세 이하의 어린이에게는 투여하지 않는다.
8. 적용상의 주의
   이 약은 황색 4호 (타르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여한다

【저장방법】 기밀용기

【포장단위】 100, 500 정

【사용기한】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 "우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품 입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 기타 자세한 사항은 대화제약 개발부(02:586~6451)로 문의 하시기 바랍니다.

설명서 개정일 : 2003. 06. 02.