

~건조한 피부에~ 소프티아 연고

분류번호:266

일반의약품

SOFTYA OINTMENT

이 약을 사용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며,
제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

【원료약품 및 그분량】 1g 중

요소(유·에스·피).....	200mg
파리옥시안식향산메틸(약전).....	0.7mg
파리옥시안식향산프로필(약전).....	0.7mg
(기제 : 스쿠알렌, 기원 : Fish Oil)	

【성 상】 흰색의 전질 균등한 연고제



◀ 주부습진 : 건조성 손, 각피증



발바닥 각피증 ▶



무릎, 팔굽, 기타 전신의
까칠한 피부에
충분히 바르고 잘 맞사지 하십시오.



【효능·효과】

진행성 지장각피증(주부습진의 건조형), 손·발바닥 각피증, 어린선(魚鱗癬), 노인성 건피증, 모공성 태선, 아토피피부
<다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다.>

【용법·용량】

1일 1~수회 환부를 씻은 다음 이 약을 바른후 충분히 문지른다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자(부위 또는 경우)에는 투여하지 말 것.
 - 1) 안점막등의 점막
 - 2) 이 약 성분에 과민증 환자
 - 3) 급성 습진 또는 염증성 피부질환 환자
 - 4) 신부전 환자에 광범위하게 적용하는 경우
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 1) 염증, 균열(갈라짐)을 수반한 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있다)
 - 2) 피부자극에 대한 감수성이 높아진 환자(일시적인 자극 증상이 나타날 수 있다)
 - 3) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 이상반응
 - 1) 자극증상 : 통증, 열감 때때로 홍조, 가려움 등의 자극증상이 일시적으로 나타났거나 투여초기에 나타날 수 있다.
 - 2) 과민증 : 과민증상이 나타날 수 있으며 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 3) 피부 : 때때로 습진화, 피부의 균열(갈라짐), 솟음, 따끔따끔한 느낌, 화끈감, 인설, 드물게 부종, 건조화가 나타날 수 있으며 이러한 증상이 심하게 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
- 상호작용

이 약에 의해 코르티코이드, 디트리놀, 5-플루오로우라실과 같은 성분의 피부로의 흡수 및 침투력이 높아질 수 있다.
- 적용상의 주의
 - 1) 이 약은 외용으로만 적용한다.
 - 2) 궤양, 미란(긁자름), 상처 부위에는 직접 적용하지 않는다.
 - 3) 눈, 코, 입 및 다른 점막에 닿지 않도록 주의하여 적용한다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낸다.
- 저장상의 주의사항

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

· 제품을 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래 용기에 넣어 보관할 것.

【포장단위】 50g

【사용기간】 제조일로 부터 27개월

- * 본 제품은 "의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효) 기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오소된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- * 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2007년 03월 12일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부 (080-855-0114)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일 : 2007년 03월 12일



대화제약주식회사

서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공장:강원도 횡성군 횡성읍 마산리 308
http://www.dhpharm.co.kr

우수약품제조관리기준

KGMP적격인증제품