알레르기성 질환 치료제

알티린 정

(염산세티리진)

분류번호:141
일반의약품

Altirin Tab.

이 약을 복용하시기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어주시기 바라며, 제품과 함께 보관하여 주시기 바랍니다.

알레르기란 ?

알레르기란 체내에 침입한 이물질(항원)에 대하여 인체내 면역기능이 과민하게 나타나 특별히 반응하는 경우를 말합니다. 알레르기를 일으키는 원인물질로는 먼지, 집먼지진드기, 꽃가루, 곰팡이, 담배연기, 각종음식물과 약물, 매연, 화학물질, 동물의 털과 분비물 등이 있습니다.

알레르기 질환의 종류 및 증상

- *알레르기성 비염 : 계절성과 통년성으로 나뉘는데, 계절성은 코의 충혈, 콧물, 재채기, 가려움증 등의 증상을 보이며 통년성은 연중 증상이 계속되며 먼지, 집먼지진드기가 주원인으로 콧물, 콧소리를 내는 등 감기와 증상이 비슷합니다.*
- *알레르기성 천식 : 알레르기로 인하여 기관지가 발작적으로 변화함으로써 좁아진 기관지때문에 호흡곤란을 일으키는 질환으로 가래와 염증을 수반하기도 합니다.*
- *알레르기성 결막염 : 눈의 점막에 염증이 생기는 것으로 보통 다른 알레르기 질환과 동시에 발생합니다. 증상으로는 눈이 충혈과 건조, 눈꼽이 끼거나 눈물이 흐르며 가려움증, 타는 듯한 느낌이 나타납니다.*
- *알레르기성 피부염 : 알레르기를 일으키는 물질이 몸속으로 들어와 주로 피부 특정부위에 두드러기나 피부염을 일으키는 것으로 대부분의 경우 심한 가려움증을 가지는 만성적이고 재발되기 쉬운 질환입니다.*

【원료약품의 분량】 1정 중

염산세티리진(B.P)……10mg

· 유당 〈기원 : 소, 사용 : 우유〉

【내용량】

- **알티린 10정 :** 150mg× 10정(총 중량 1.5g)
- **알티린 200정 :** 150mg× 200정(총 중량 30g)
- **알티린 500정 :** 150mg× 500정(총 중량 75g)
- **알티린 1000정 :** 150mg×1000정(총 중량 150g)

【성 상】 백색의 타원형 필림제피정

【효능 · 효과】

1. 계절성 및 다년성 알레르기성 비염, 알레르기성 결막염, 만성 특발성 두드러기, 피부 가려움증
2. 하이드로코티손 외용제와 함께 복용함에 의한 습진, 피부염

〈다른 용도로 사용시 심한 이상반응이 나타날 수 있다.〉

【용법 · 용량】

성인 및 6세 이상의 소아 : 염산세티리진으로서 1일 1회 10mg 취침전에 경구투여한다. 이상반응에 민감한 환자의 경우는 5mg씩 아침, 저녁에 분할 투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 이 약 및 히드록시진에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
   2) 신부전 환자
   3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
   4) 6세 미만의 유아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 신장애 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
   2) 간장애 환자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)
   3) 고령자(높은 혈중 농도가 지속될 수 있다.)

3. 이상반응
1) 정신신경계 : 졸음, 때때로 권태감, 두통, 마비감, 드물게 가볍고 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 머리가 무겁고, 흥분이 나타날 수 있다.
2) 소화기계 : 때때로 목마름, 입술건조감, 구역, 입맛없음, 배가 거북함, 소화불량, 배 아픔, 위통, 복부불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 입술염, 미각이상이 나타날 수 있다.
3) 순환기계 : 드물게 맥박이 빨라지며, 부정맥, 혈압상승, 때때로 심계항진이 나타날 수 있다.
4) 혈액 : 혈관염, 때때로 백혈구 감소, 호중구 감소, 림프구 증가, 호산구 증가, 드물게 단구 증가, 혈소판 증가가 나타날 수 있다. 또한 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 한다.
5) 과민증 : 햇빛 노출시 피부 과민반응, 아나필락시 쇽, 때때로 부종, 드물게 발진, 가려움, 맥관부종이 나타날 수 있다.
6) 눈 : 드물게 흐린 시력, 결막충혈이 나타날 수 있다.
7) 간 : 때때로 AST, ALT, ALP, 총빌리루빈, γ-GTP, LDH의 상승 등 간기능 장애(초기증상 : 전신권태감, 입맛없음, 발열, 구역 등), 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
8) 신장 : 때때로 BUN 상승, 당뇨, 요잠혈이 나타날 수 있다.
9) 기타 : 인두염, 기침, 코피, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 가슴쓰림, 드물게 월경불순, 귀에서 소리 들림이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
건강한 지원자에게 1일 20~25mg을 투여한 결과, 민첩성이나 반응시간에 어떠한 이상반응도 나타내지 않았으나 운전이나 기계조작시에는 용량을 초과하지 않는다.
5. 상호작용
다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 함께 복용하지 않는다.
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 동물실험결과 기형발생이 보고된 바 없으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여하지 않는다.
2) 이 약이 모유를 통해 미량 분비되므로 투여중에는 수유를 중단한다.
7. 소아에 대한 투여
6세 미만의 유아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않는다.
8. 고령자에 대한 투여
이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에는 혈중 농도 과다상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정 될 경우에는 복용량을 줄이거나 중지하고 적절한 처치를 한다.
9. 과량투여시의 처치
과량투여시의 증상은 진정이다. 이 경우 위세척을 실시한다.
10. 임상검사치에의 영향
이 약은 알레르기항원피내반응을 억제하므로 알레르기항원피내반응검사를 실시하기 3~5일 전에는 이 약을 투여하지 않는 것이 바람직하다.
11. 기타
증상에 따라 이 약으로서 1일 10mg 투여로 개선이 없을 경우, 의사 또는 약사의 지시에 따라 1일 20mg까지 투여한 임상보고가 있다.
12. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.
3) 오용을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저 장 방 법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)
【포 장 단 위】 10, 200, 500, 1000정
【사 용 기 간】 제조일로부터 36개월

※ 본 제품은 "의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)"에 따라 제조 및 품질검사를 한 의약품 입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과하였거나, 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
※ 기타 자세한 사항이나 첨부문서의 작성일자(2004년 09월 20일) 이후 변경된 내용은 홈페이지나 대화제약 개발부(02:586-6451)로 문의하시기 바랍니다.

첨부문서 개정일 : 2004년 09월 20일

대화제약주식회사
서울특별시 관악구 남현동 1056-16호
공장:경기도 시흥시 정왕동 시화공단1라603
http://www.dhpharm.co.kr

우수의약품제조관리기준
KGMP적격업소제품