「일반의약품」

알레르기질환에—

알러텍® 정

알레르기성비염 · 결막염 · 가려움증, 두드러기

알러텍정은 H1-수용체를 선택적으로 차단하여 알러지 유발물질인 히스타민(Histamine)의 유리를 억제하고, 알러지반응의 마지막 단계에서 Eosinophil이 염증부위로 이동하는 것을 막아주는 3단계의 작용을 거쳐 알러지 질환을 효과적으로 치료해주는 알러지질환 전문치료제입니다.
또한 알러텍정은 세로토닌(Serotonin)이나 콜린(Choline)수용체에는 작용하지않고 말초성 H1-수용체에만 선택적으로 작용하므로 구갈, 배뇨곤란, 위장장애, 졸음, 진정작용과 같은 부작용이 거의 없을 뿐 아니라, 투여 1시간후에 최고혈중농도에 도달하는 작용발현이 매우 빠른 제제인 반면, 약효가 24시간 지속되므로 1일 1회 1정 복용으로도 충분한 효과를 나타냅니다.

■ **원료약품의 분량** : 1정 중
염산 세티리진(이 피) ····· 10mg

■ **성 상** : 백색의 장방형 필름코팅정제

■ **효능 · 효과**
1. 계절성 및 다년성 알레르기성 비염, 알레르기성 결막염, 만성 특발성 두드러기, 피부소양증
2. 하이드로코티손 외용제와 병용에 의한 습진, 피부염

■ **용법 · 용량**
성인 및 6세 이상의 소아 : 염산세티리진으로서 1일 1회 10mg을 취침전에 경구투여합니다.
부작용에 민감한 환자의 경우는 5mg씩을 아침, 저녁에 분할 투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ **사용상의 주의사항**
1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약 및 히드록시진에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
   2) 신부전 환자
   3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
   4) 6세 미만의 유아
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 신장애 환자(높은 혈중농도가 지속될 수 있습니다.)
   2) 간장애 환자(높은 혈중농도가 지속될 수 있습니다.)
   3) 고령자(높은 혈중농도가 지속될 수 있습니다.)
3. 부작용
   1) 정신신경계 : 졸음, 때때로 권태감, 두통, 마비감, 드물게 가볍고 일시적인 나른함, 피로, 어지러움, 두중, 흥분이 나타날 수 있습니다.
   2) 소화기계 : 때때로 구갈, 구순건조감, 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 소화불량, 복통, 위통, 복부불쾌감, 드물게 구토, 위장장애, 설사, 구순염, 미각이상이 나타날 수 있습니다.
   3) 순환기계 : 드물게 빈맥, 부정맥, 혈압상승, 때때로 심계항진이 나타날 수 있습니다.
   4) 혈액 : 맥관염, 때때로 백혈구 감소, 호중구 감소, 림프구 증가, 호산구 증가, 드물게 단구 증가, 혈소판 증가가 나타날 수 있습니다. 또한 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 합니다.
   5) 과민증 : 광과민증, 아나필락시 쇽, 때때로 부종, 드물게 발진, 가려움, 맥관부종이 나타날 수 있습니다.
   6) 눈 : 드물게 흐린 시력, 결막충혈이 나타날 수 있습니다.
   7) 간 : 때때로 AST, ALT, ALP, 총빌리루빈, γ-GTP, LDH의 상승 등 간기능장애(초기증상 : 전신 권태감, 식욕부진, 발열, 구역 등), 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하여 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 합니다.
   8) 신장 : 때때로 BUN상승, 당뇨, 요잠혈이 나타날 수 있습니다.
   9) 기타 : 인두염, 기침, 비출혈, 기관지경련, 청력이상, 시각이상, 때때로 흉통, 드물게 월경불순, 이명이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
   건강한 지원자에게 1일 20-25mg을 투여한 결과, 민첩성이나 반응시간에 어떠한 부작용도 나타내지 않았으나 운전이나 기계조작시에는 용량을 초과하지 않습니다.
5. 상호작용
   다른 항히스타민제와 마찬가지로 과량의 알코올과 병용투여 하지 않습니다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 동물 실험결과 기형발생이 보고된 바 없으나 아직 충분한 연구가 없으므로 임부에는 투여하지 않습니다.

2) 이 약이 모유를 통해 미량 분비되므로 투여중에는 수유를 중단합니다.

7. 소아에 대한 투여

6세 미만의 유아에 대한 사용경험이 적어 투여하지 않습니다.

8. 고령자에 대한 투여

이 약은 주로 신장을 통해 배설되므로 일반적으로 신기능이 저하되어 있는 고령자에는 혈중농도 과다 상태가 지속될 수 있으므로 저용량으로 신중히 투여를 시작하고 이상이 인정될 경우에는 감량하거나 휴약하고 적절한 처치를 합니다.

9. 과량투여시의 처치

과량투여시의 증상은 진정입니다. 이 경우 위세척을 실시합니다.

10. 임상검사치에의 영향

이 약은 알레르기향원피내반응을 억제하므로 알레르기향원피내반응검사를 실시하기 3-5일 전에는 이 약을 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

11. 기타

증상에 따라 이 약으로서 1일 10mg 투여로 개선이 없을 경우, 의사 또는 약사의 지시에 따라 1일 20mg까지 투여한 임상보고가 있습니다.

■ **저장방법 :** 기밀용기, 실온보관 (사용기간 : 3년)

■ **포장단위 :** 10, 30, 100, 500정

■ **설명서 작성일 :** 2002년 11월 30일

■ **소비자 상담실 :** ☎(02)529-6100~9 (교환)312

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하셨을때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

20021130

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 사용전에 첨부 설명서를 꼭 읽으십시오.
※ 기타 의문사항은 의·약사와 상의하거나 회사로 문의하십시오.
※ 회사 홈페이지주소 : http://www.nicepharma.com

고려제약주식회사
본사 : 서울특별시 강남구 도곡동 423-2 ☎02) 529-6100~9
공장 : 경기도 이천시 신둔면 수광리 486 ☎031) 634-7100~2