KGMP
적격업체

위 • 십이지장궤양치료제

탈민정

Tripotassium Dicitrato Bismuthate

500정

전문의약품
분류번호:232

【원료약품의 분량】 1정중
구연산 비스마스 칼륨(식품의약품청 고시 제98-127호) ····· 300mg

【성상】 백색의 원형 필름 코팅정

【효능 • 효과】 위 • 십이지장궤양

【용법 • 용량】
성인:구연산비스마스칼륨으로서 1회600mg 1일2회 아침, 저녁 식전 30분에 경구투여한다. (깨물어서는 안되며 소량의 물로 삼킨다.) 또한, 1회 300mg 1일4회 식전 30분 및 저녁식사후 2시간에 투여할 수도 있다. 이 약 투여 전후 30분 동안은 음식물이나 음료수를 섭취해서는 안된다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【저장방법】 기밀용기

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 신장애 환자
2. 부작용
   1) 치료초기에 드물게 동통, 구역, 구토, 위장작열감 등이 나타날 수 있다.
   2) 황화비스마스의 형성에 의하여 대변이 변색 또는 검은색으로 변할수 있다.
3. 상호작용
   1) 테트라사이클린계 항생물질의 흡수를 저해할 수 있으므로 병용투여 하지 않는다.
   2) 제산제에 의해 효과가 감소될수 있으므로 이 약 투여 전후 30분동안에는 제산제를 투여하지 않는다.
4. 임부에 대한 투여
   임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 투여하지 않는것이 좋다.
5. 수유부에 대한 투여
   투약중에는 수유를 하지 않도록 주의한다.
6. 소아에 대한 투여
   소아에는 투여하지 않는것이 바람직하다.

8 806104 802661

제조발매원
永一藥品工業株式會社
서울특별시 서초구 방배동 920-27

제조번호:
사용기한: