

덴시론

캡슐

DENSIRON Cap.

K G M P

일반의약품

적격업체

분류번호:231

치아는 예로부터 오복중의 하나로 중요하지만 치아 못지않게 중요한 것이 치아를 감싸주고 받쳐주는 치아지지조직(잇몸조직)입니다. 치주질환(齒周疾患)은 일반적으로 치주조직(잇몸조직)의 염증 또는 치아의 이완 동요(이가 시리다 흔들린다), 잇몸에서 피가 난다, 냄새가 난다 등으로 시작하여 치조골(잇몸뼈)의 소실(잇몸이 주저앉음)로 인하여 치아와 잇몸 사이에 존재하여 치아를 고정시켜 주는 치주인대가 상하고 그곳에 세균이 침입하여 치조화농을 일으켜 치조농루(齒槽膿漏)에 이르게 합니다.

이렇게 되면 치아가 들뜨고 흔들리며 더 진행되면 누런 고름이 생기고 치아를 빼야 합니다.

덴시론 캡슐은 일반적인 항염증제와는 달리 독특한 뮤코다당류 분해효소제를 주성분으로 하여 치조(齒槽)에 침입한 세균의 세포벽을 파괴시키는 그람양성균에 대한 용균작용(溶菌作用)이 강력하여 그 손상부위를 소염시키고 파괴된 치조골의 조직 하나하나가 다시 재생되도록 촉진하여 치주인대(잇몸과 치아 사이의 결합막)를 소생시켜 줍니다.

덴시론 캡슐은 모세혈관 투과성을 억제하여 손상된 치조골 주위의 혈행을 촉진하고 치밀하게 하여 염증을 소실시킵니다.

덴시론 캡슐은 병변부의 청정화·육아형성·탈취살균작용을 통하여 치주조직에서의 배농으로 일어나는 입냄새를 제거하여 줍니다.

덴시론 캡슐은 잇몸치료 후에 복용하면 치료기간이 단축되고 항생물질과 병용시 치료효과가 상승되며 내약성이 우수하여 장기 복용하는데 어려움이 없습니다.

【원료약품의 분량】 1캡슐 중

염화리소짐(식약청고시 제98-127호)	30.0mg(역가)
제회형 아스코르빈산 96% Type SC(별첨)	156.25mg
(아스코르빈산으로서 150mg)	
건초조산 토코페롤 50% Type SD(별첨)	60.0mg
(초산토코페롤로서 30IU)	
동글로로필린 나트륨(식약청고시 제98-127호)	20.0mg

【성 상】 짙은 청녹색의 분말이 든 상, 하 녹색의 경질 캡슐제

【작용 및 특징】

1. 치조골의 재생 및 치주인대의 소생을 촉진합니다.

덴시론 캡슐은 보통 소염제와는 달리 독특한 뮤코다당류 분해효소제를 주성분으로 하여 치조에 염증을 일으키는 세균 세포벽의 N-Acetylglucosamine과 N-Acetylmuramic acid의 $\beta(1-4)$ 의 결합을 가수분해함으로써 그람양성균에 대한 용균작용(溶菌作用)뿐만 아니라 그람음성균·바이러스에 이르기까지 항균작용이 강력하여 그 손상부위를 소염시키고 파괴된 치조골의 조직 하나하나가 다시 재생되도록 촉진하여 치주인대를 소생시켜 줍니다.

2. 치주조직의 말초혈행을 촉진합니다.

덴시론 캡슐은 모세혈관 투과성을 억제하여 손상된 치조골 주위의 혈행을 촉진하고 치밀하게 하여 염증을 소실 시킵니다.

3. 덴시론 캡슐은 잇몸 치료후에 복용하면 치료기간이 단축되고 항생물질과 병용시 치료효과가 상승됩니다.

4. 덴시론 캡슐은 병변부의 청정화·육아형성·탈취살균작용을 통하여 치주조직에서 배농으로 일어나는 입냄새를 제거하여 줍니다.

5. 덴시론 캡슐은 잇몸의 통증을 경감시키며 내약성이 우수하여 장기 복용하는데 어려움이 없습니다.

【효능·효과】

치은염, 치조 농루에 의한 여러증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 고름등)의 완화

【용법·용량】

성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 본인 또는 양친, 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고있는 환자
- 2) 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
- 3) 다른 약물을 투여받고 있는 환자

2. 부작용

이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.

- 1) 피부 : 스티븐스-존슨증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안충혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는 발진·발적, 화상 양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.

3. 일반적 주의

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 1개월 이상 투여하여도 증상의 개선이 보이지 않는 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사(치과의사)와 상의한다.
- 3) 이 약은 14세 이하의 소아에게 투여하지 않는다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고, 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위해서 다른 용기에 넣지 않는다.

【포장단위】 200캡슐

【저장방법·사용기간】

차광 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

* 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

* 이 첨부문서 작성일자(2006년 7월)이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.

* 제조판매원 : 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 신정리 521-15

설명서개정년월 : 2006년 7월



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr