

HANAMAXTM Tab.

【원료약품의 분량】 1정(640.0mg)중

판크레아틴(KP)	175.0mg
우담즙엑스(KPC)	25.0mg
디메치콘(NF)	25.0mg
헤미셀룰라제(KPC)	50.0mg

【성상】 백색의 장용성 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 방사선 검사전의 가스제거

【용법·용량】 성인 1회 1-2정 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 : 다른 약물을 투여 받고 있는 환자
3. 일반적 주의 1)정해진 용법용량을 잘 지킨다. 2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
4. 소아에 대한 투여 : 이 약은 7세 미만의 영·유아에게는 투여하지 않는다.
5. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월



판매원

광동제약(주)

경기도 평택시 모곡동 440-2



제조원

동인당제약주식회사

경기도 시흥시 정왕동 1248-8(시화공단 1라-603호)

www.dongin-dang.co.kr

소비자상담실 ☎ 031-319-1990