일 반 의 약 품

분류번호 : 222

호흡기 점액분비장애 개선제

프렌틸 정

(염산 암브록솔)

■ 성분 · 함량 : 1정중

염산 암브록솔(식약청고시 제98-127호) ····· 30mg

■ 성 상

백색의 원형 정제

■ 효능 · 효과

· 주효능 효과

점액분비장애로 인한 급 · 만성 호흡기 질환 : 급 · 만성 기관지염, 천식성기관지염, 부비강염, 건성 비염

KGMP

Otorhinolaryngeal · respiratory tract disorder therapeutic agent

Frentil 1000Tab.

(Ambroxol · HCl)

■ 용법 · 용량

성인 : 염산암브록솔로서 1회 30mg 1일 3회 경구투여합니다. 계속 치료시 1회 30mg 1일 2회 투여합니다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에게는 투여하지 말 것 : 이 약에 과민증 환자 2. 다음 환자에게는 신중히 투여할 것 : 중증 신장애 환자 3. 부작용 1) 소화기계 : 드물게 위부불쾌감, 위 · 복부팽만감, 위 · 복통, 설사, 변비, 구역, 구토, 가슴쓰림, 식욕부진 등이 나타날 수 있다. 2) 과민증 : 드물게 발진, 두드러기, 두드러기양 홍반, 가려움, 안면종창, 호흡곤란, 오한을 수반한 체온상승 등이 나타날 수 있다. 극히 드물게 암브록솔과의 관련성에 상관없이 중증의 급성 아나필락시스양 반응이 나타났다는 보고가 있었으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다. 3) 호흡기계 : 백혈구 증가를 수반하는 화농성 비염이 나타날 수 있다. 4) 기타 : 드물게 구내마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있다. 4. 상호작용 : 에리스로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 아목시실린, 세퓨록심, 독시사이클린 등의 항생물질과 병용투여시 폐조직에서의 항생물질의 작용을 증강시킬 수 있다. 5. 임부 및 수유부에 대한 투여 : 임신중 및 수유부에 대한 투여시 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다(특히 임신초기 3개월 이내에는 투여하지 않는다). 6. 고령자에 대한 투여 : 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

■ 저장방법

밀폐용기, 실온보관

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 사용기한이 지났거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 있으면 구입한 약국이나 담당영업소에서 교환하여 드립니다.

개정일 : 03. 2. J

• 제조번호 :

• 사용기한 :

8 806103 410515

인류를 건강하게--

경동제약주식회사

공장 : 경기도 화성시 양감면 대양리 535-3

소비자상담실 전화번호 : (02)576-6121