

호흡기 질환 치료제

이텍스 암브록솔 정

(염산암브록솔)

1000정

일반의약품

분류번호 : 222

이텍스 암브록솔정은 표면활성물질(surfactant)의 생성 촉진작용으로 폐포에서 기관지에 이르는 점액분비 및 수송체계를 정상화시켜 객담 배출을 촉진하는 염산암브록솔로서 부비강염, 건성비염, 만성기관지염, 기관지 천식 등의 급·만성 호흡기질환 치료에 효과적인 제제입니다.

- 성분·함량 : 1정중
염산암브록솔(KPC) 30mg
- 성상 : 백색의 정제
- 효능·효과
점액분비장애로 인한 급·만성 호흡기 질환 : 급·만성기관지염, 천식성기관지염, 부비강염, 건성비염
- 용법·용량
성인 : 염산암브록솔로서 1회 30mg 1일 3회 경구투여합니다.
계속 치료시 1회 30mg 1일 2회 투여합니다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.
- 사용상의 주의사항

1. 경고
이 약에 함유되어 있는 인공감미제 아스파탐은 체내에서 분해되어 페닐알라닌으로 대사되므로, 페닐알라닌의 섭취를 규제할 필요가 있는 유전성질환인 페닐케톤뇨증 환자에게는 투여하지 마십시오.

- 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 환자
 - 2) 갈락토오스 불내성, Lapp 유당분해효소 결핍, 글루코오스-갈락토오스 흡수불량의 유전적 소인을 가진 환자
- 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 중증 신장에 환자
 - 2) 임부 : 이 약은 태반장벽을 통과한다. 전임상시험 뿐만 아니라 임신 28주후의 임상 경험에서도 임신중에 약영향의 증거는 보이지 않았으나 이 약은 임신중에 투여가 권장되지 않는다.(특히, 임신 초기 3개월 이내에는 투여하지 않는다.)
 - 3) 수유부 : 이 약은 모유로 이행하므로 수유중인 여성은 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 4) 고령자 : 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약과 같은 점액용해제 복용과 관련하여 스티븐스-존슨 증후군, 리엘 증후군 같은 심각한 피부 손상이 매우 드물게 보고되었다. 이 약 복용중 새로운 피부/점막 손상이 나타나면 즉시 복용을 중지하고 전문가의 상담을 받아야 한다.
- 2) 소화기계 : 때때로 소화불량, 구역, 구토, 가슴쓰림, 구강건조를 포함하는 경미한 상부 위장관계 이상반응, 드물게 위부불쾌감, 위·복부팽만감, 위·복통, 설사, 변비, 식욕부진 등이 나타날 수 있다.
- 3) 과민증 : 드물게 피부 발진과 같은 알러지 반응과 중증의 급성 아나필락시스양 반응(아나필락시스 속 포함)이 보고되었으며, 두드러기, 두드러기양 홍반, 맥관부종, 기어움, 안면종창, 호흡곤란, 오한을 수반한 체온상승 등이 나타날 수 있다.
- 4) 호흡기계 : 백혈구증가를 수반하는 화농성 비염이 나타날 수 있다.
- 5) 신경계 : 때때로 허의 감각이상, 미각 변화가 보고되었으며, 드물게 구내마비감, 팔의 마비감 등이 나타날 수 있다.
- 5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
에리스로마이신, 세팔렉신, 옥시테트라사이클린, 이목시실린, 세퓨록심, 독시사이클린 등의 항생물질과 병용투여시 기관지폐 분비물과 객담에서 항생물질의 농도를 증가시킨다.

■ 포장단위 : 300, 500, 1000정

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

제조번호 :

사용기한 :

- 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.
- 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP) 적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변색·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- 개정연월 이후 변경된 내용은 02)2109-4260이나 www.etexpharm.com 에서 확인할 수 있습니다.

개정연월 : 2008.08

생명과학 연구중심 제약기업
(주)이텍스제약
경기도 안산시 단원구 초지동 619-1

