성인용/소아용

전문의약품	
분류번호	142

호흡기질환 치료제

브롱코박솜® 캅셀

broncho-vaxom® Caps.

표준화된 동결건조 균체용해물

bronho-vaxom® cap은 스위스 OM PHARMA에서 개발된 경구용 면역증강제로서 유럽전지역에서 우수한 효과를 인정받고 있습니다.
bronho-vaxom® cap은 체내에서 감염증을 일으키는 8종의 세균을 용해하여 동결건조시킨 비특이성 면역원 제제로 인체의 면역기능을 증강시켜 능동적인 치유를 유도하는 전혀 새로운 차원의 상 · 하기도 감염증 치료제입니다. bronho-vaxom® cap은 특히 재발성 호흡기질환에 효과가 뛰어나며 부작용이 거의 없고 내성이 우수한 면역증강제입니다.

【원료약품의 분량】

● 브롱코박솜 캅셀(성인용)
1캅셀중 표준화된 동결건조 균체용해물(별규) ····· 40밀리그람
(동결건조 균체용해물로서 7.0밀리그람)

● 브롱코박솜 캅셀(소아용)
1캅셀중 표준화된 동결건조 균체용해물(별규) ····· 20밀리그람
(동결건조 균체용해물로서 3.5밀리그람)

【성상】

bronho-vaxom® cap은 백색 또는 매우 약한 베이지색 분말이 충전된 경질 캅셀제로서 소아용 캅셀의 윗부분은 푸른색 아래는 백색이며, 성인용의 캅셀은 위, 아래 모두 푸른색입니다.

【효능 · 효과】

상 · 하기도의 재발성 감염
특히 만성 호흡기질환(기관지염, 부비동염 등)

【용법 · 용량】

성인:동결건조 균체용해물로서 1일 1회 7mg(1캅셀)을 아침 공복시 소량의 물과 함께 경구투여 합니다.
소아:동결건조 균체용해물로서 1일 1회 3.5mg(1캅셀)을 아침 공복시 소량의 물과 함께 경구투여 합니다.

1. 단기치료 : 최소한 1개월간 투여



2. 장기치료 : 3개월 연속 투여
● 급성감염시 : 30일간 투여후 다음 2개월간은 월 10일씩 투여(20일간의 휴약기를 둡니다.)



● 무감염시 : 3개월 동안 월 10일씩 투여



연령, 증상에 따라 적절히 증감합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약의 성분에 과민증 환자　2) 급성 위장염 환자　3) 1세 이하의 영아
2. 부작용
   1) 소화기계 : 때때로 가벼운 위장장애(설사, 복통, 구토)가 나타날 수 있습니다.
   2) 피부 : 드물게 알레르기성 피부질환(가려움증, 피부발진 등)이 나타날 수 있습니다.
   3) 호흡기계 : 기침, 호흡곤란, 천식이 나타날 수 있습니다.
   4) 기타 : 드물게 투여 첫 날 호흡기 염증의 경미한 악화. 가벼운 발열이 나타날 수 있으며 그밖에 피로감. 알레르기 반응이 나타날 수 있습니다.
3. 상호작용
   1) 경구용 생백신 투여 2주전, 투여후 2주동안은 투여하지 않습니다.
   2) 면역억제요법은 이 약의 효과에 영향을 미칠 수 있습니다.
4. 임부에 대한 투여
   임신 초기 3개월동안은 투여하지 않습니다.
5. 소아에 대한 투여
   1세 이하의 영아에는 면역체계가 미성숙한 상태이므로 투여하지 않습니다.

【저장방법및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)보관　사용기간 : 5년

【포장단위】

브롱코박솜 캅셀(성인용) 10, 30, 150, 300캅셀
브롱코박솜 캅셀(소아용) 10, 30, 150, 300캅셀

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만일 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국이나 병원을 통하여 교환하여 드립니다.

원료공급 및 기술제휴: OM PHARMA.(Swiss)

제조원: 녹십자상아 SANG-A
충북 음성군 금왕읍 내송리 156-50 TEL.031)260-9300,9248

판매원: 녹십자PBM
경기도 용인시 구성읍 보정리 303

Nov03