

씨앤유캡슐

(케노데스옥시콜린산과우르소데스옥시콜린산의삼수화물마그네슘염)

분류번호 : 236

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(478mg) 중

케노데스옥시콜린산과우르소데스옥시콜린산의삼수화물마그네슘염(별규) 250mg

(케노데스옥시콜린산으로서 114mg, 우르소데스옥시콜린산으로서 114mg)

【성 상】 흰색의 가루가 들어있는 상하부 흰색의 경질캡슐제

【효능·효과】

- 콜레스테롤담석증 (방사선 투과성 담석증) : 특히 담낭기능이 정상인 환자의 담석, 담도결석, 담도수술 후 재발하는 담석
- 담즙성 소화불량

【용법·용량】

- 담석증 : 1일 2-3캡슐
- 담즙성 소화불량 : 1일 1-2캡슐을 식중 또는 식후복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 가. 빈번한 담즙성산통이나 담도감염이 있는 환자에 있어서는 심한 체장 변화(회장의 절개, 절제수술, 부분적인 회장염 등) 및 장의 질환에 의해 장간 순환하는 담즙산의 조성이 변경 될 수 있다.
 - 나. 폐쇄성 황달 환자
 - 다. 간질환 환자
 - 라. 중증 신장질환 환자
 - 마. 이 약에 과민성을 나타내는 환자
 - 바. 임신부
- 다음 환자에는 신중히 투여 할 것.
 - 가임부에게 투여가 가능하나, 임신시는 투여를 중단한다. 치료중에는 적절한 피임법을 고려하는 것이 좋다. (호르몬 피임제는 이 약의 효과를 증진시킬 수 있으므로 사용하지 않는다.)
- 부작용
 - 간혹 장의 활동에 변화가 나타날 수 있으며, 드물게 transaminase 변수가 변할 수 있다. 이런 증상은 치료 중 자연적으로 사라지거나, 용량을 감소하면 치유된다.
- 일반적 주의
 - 가. 담즙 내 콜레스테롤이 탈포화되는지 확인하기 위해 담즙 조성에 대하여 조사하는 것이 성공적인 치료에 있어서 중요하다.
 - 나. 치료를 시작할 때, 약 3주 후 및 3개월마다 transaminase 및 alkaline phosphatase 변수를 확인하는 것이 좋다.
 - 다. 6개월마다 담낭조영술(Cholecystography) 또는 초음파촬영술(echography)로 치료법의 효과정도를 확인한다.
 - 라. 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 약물 상호 작용
 - 아래의 약물과 병용 투여하지 않는다.
 - 가. 간독성이 큰 약물
 - 나. Cholestyramine
 - 다. Alphamethyldopa
 - 라. 콜레스테롤의 담즙분비를 증가시키는 약물 (estrogen, 호르몬성 피임제, hypolipemics)

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)건냉암소보관

【사용기간】 3년

【포장단위】 자사포장단위

* 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

* 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지 또는 소비자 상담전화로 확인하실 수 있습니다.

☎ 소비자상담전화 : 080-022-5805 (무료전화서비스)

제조·판매원

 명문제약주식회사

경기도 화성시 향남읍 상신리 901-1

www.mmmpharm.co.kr

〈설명서작성년월:09 . 05〉

〈M01〉