

푸락스정

(메실산프리디놀)
2밀리그램 / 4밀리그램

골격근이완제

분류번호:122

전 문 의 약 품

푸락스정은 골격근의 이상긴장에 의해 초래되는 각종 동통성 질환에 유효한 골격근이완제로서 병적으로 항진된 골격근의 경련 경축을 효과적으로 제거하여 이로 인한 통증을 완화시켜 줍니다.

■원료약품 및 그 분량

1정 중
메실산프리디놀(식약청고시 제98-127호)2mg / 4mg

■성 상

2mg : 주황색의 원형 당의정
4mg : 분홍색의 원형 당의정

■효능·효과

근골격계 질환에 수반하는 동통성 연속 : 요배통증, 경견완 증후군, 견관절 주위염, 변형성 척추증

■용법·용량

성인 : 메실산프리디놀로서 1회 4mg 1일 3회 경구투여한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■사용상의 주의사항

1.다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1)이 약에 과민증 환자
- 2)녹내장 환자(항콜린작용에 의해 안압을 상승시킬 수 있다.)
- 3)전립선비대에 의한 배뇨곤란 환자(항콜린작용에 의해 배뇨장애를 악화시킬 수 있다.)
- 4)중증의 심질환 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 5)마비성 장폐색증 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 6)거대 결장증 환자
- 7)급성 폐부종 환자
- 8)빈맥 환자
- 9)중증의 동맥경화증 환자
- 10)위장관부위협착 환자

2.다음 환자에는 신중히 투여할 것

간·신장애 환자

3.부작용

- 1)과민증 : 발진, 두드러기, 드물게 아나필락시양 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지한다.
- 2)정신신경계 : 때때로 어지러움, 비틀거림, 실신, 졸음, 불안, 환각, 무력감, 권태감 등이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 한다.
- 3)골격근 : 드물게 근이완, 근무력증, 장시간 정좌불능 등이 나타날 수 있다.
- 4)소화기계 : 식욕부진, 가슴쓰림, 위거복함·위부불쾌감, 구갈, 때때로 구역·구토, 설사, 심와부통·위통 등이 나타날 수 있다.
- 5)피부 : 한선분비감소, 홍반
- 6)눈 : 시조절장애, 협우각형녹내장이 나타날 수 있다.

4.일반적 주의

졸음, 주의력·집중력·반사운동능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.

5.상호작용

- 1)다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 병용투여하지 않는 것이 바람직하나 부득이하게 투여하는 경우에는 감량하는 등 주의한다. : 페노치아진계 약물 (클로르프로마진 등), 바르비탈계 약물 등의 중추신경억제제, MAO저해제
- 2)다음 약물과의 병용에 의해 이 약의 항콜린작용이 증강될 수 있다. : 아만타딘, 퀴니딘
- 3)도파민길항제(메토클로프라미드 등)와 병용시 위장관 작용을 상쇄시킨다.

6.임부 및 수유부에 대한 투여

- 1)임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2)이 약은 모유중으로 이행하므로 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.

7.소아에 대한 투여

유·소아에 대한 안전성이 확립되어있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.

8.고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의한다.

■저장방법

밀폐용기, 실온보관(1℃~30℃)

■포장단위

50, 100, 500, 1000정

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을 구입하였을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※소비자 상담전화 : 080 - 577 - 8004(수신자 요금부담서비스)

작성년월 : 97. 9.

개정년월 : 05. 8. <H05>

제 조 · 판 매 원

히니제약주식회사

경기도 화성시 향남면 상신리 907-3