KGMP
적격업소

전문의약품
분류번호 217

혈관확장제

두소릴 캅셀

(수산나프로닐)

두소릴 캅셀은 아래와 같이 뇌세포의 대사를 촉진하고, 말초혈관을 확장시키므로서 기질적 또는 기능적 말초의 혈행 및 영양장애를 치료합니다.

【약리작용】

1. 뇌세포대사 촉진작용
   1) 뇌혈관을 확장시켜 뇌의 혈액 공급량을 증가시키고 산소결핍에 대한 저항성을 증가시킵니다.
   2) Krebs cycle에 작용하여 뇌의 Succinodehydrogenase를 활성화시켜 뇌세포의 ATP생성 및 산소이용율을 증가시킵니다.
   3) EEG파장(뇌파)의 Pattern을 개선하여 뇌에 대한 전기적 작용에서 보이는 것과 같은 정신 긴장(활발하고 민첩한 정신작용)을 나타냅니다.
   4) 낮아진 뇌의 온도를 상승시킵니다.
2. 말초혈관확장작용
   1) 신경절과 후신경절에 대한 교감신경억제작용을 나타내어 혈관확장 작용을합니다. 그러나 교감신경수용체에 대해서는 억제작용이 없으므로 심박도나 혈압에는 영향을 주지 않습니다.
   2) 강한 국소마취작용, 항브라드키닌작용, 항세로토닌 작용을 나타냅니다.
   3) 파파베린보다 8배나 강한 경련 이완작용이 있기 때문에 동맥경련을 소실시키며 말초혈관 세포조직에 있는 불순물을 제거시킵니다.

【원료약품 및 그 분량】 1캅셀중

수산나프로닐(식약청고시) ····· 100mg

【성　　상】

백색분말이 들어있는 상하 적색의 캅셀

【효능·효과】

기능적, 기질적 말초의 혈행 및 영양장애, 뇌혈행 및 뇌영양장애로 인한 증상, 내이의 혈행 및 영양장애, 눈의 망막 및 맥락막 혈행 및 영양장애

【용법·용량】

1회 1캅셀씩 1일 3회 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음환자에는 투여하지 말 것.
   1) 초기의 심근경색, 심부전, 초기의 출혈성 상해, 저혈압 허탈, 기립성 조절장애 환자
   2) 이 약에 대해 과민증인 환자
2. 부작용
   구역, 위통, 설사, 현기, 불면증, 감염, 간장애 등이 나타날 수 있다.
3. 일반적 주의
   이 약은 장기간 사용으로 저혈압 작용은 없으며 동맥성 고혈압 치료제로 사용치 말 것.
4. 상호작용
   이 약은 부정맥 치료제나 베타차단제 병용시 상가작용이 있음.

【저장방법】 : 밀폐용기

【사용기간】 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】 : 10, 100, 500, 1000캅셀

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준 (KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

작성일 : 2002. 9. 3

Meditech

제조판매원
한국메디텍제약주식회사
MEDITECH KOREA PHARM. CO.,LTD.
경기도 화성시 향남면 상신리 902-2 T 031-353-1570-1