전문의약품
분류번호114

해열 · 진통 · 소염제

솔라메트 정 500정

(탈니플루메이트 370mg)

8 806113 902062

SOLAMET Tab

Non-steroidal Anti-inflammatory Drug

【원료약품의 분량】 1정중

탈니플루메이트(식품의약품안전청고시) ····· 370mg

【성 상】 황색의 원형 필림코팅정제

【효능 · 효과】

1.다음 질환에 사용할 수 있다.

류마티양관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 좌골신경통, 무월경성 동통, 외상후 동통, 수술후 염증 및 동통, 건초염, 염좌, 자궁부속기염, 인두염, 편도염, 이염, 부비동염

【용법 · 용량】

성인 : 탈니플루메이트로서 1회 370mg 1일 3회 경구투여한다. 중증일 경우에는 1회 740mg을 투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의 사항】

1.다음 환자에는 투여하지 말것.

1)이 약에 과민증 환자 2)소화성궤양 또는 그 병력이 있는 환자

2.다음 환자에는 신중히 투여할 것.

1)간장애 환자 2)신장애 환자

3.부작용

1)과민증 : 일반적으로 내성이 좋으나 과민증 환자는 구역, 구토가 일어날 수 있다.

2)소화기 : 장기 투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장출혈, 소화성 궤양,및 천공이 나타날 수 있다.

4.일반적 주의

1)소염진통제에 의한 치료는 원인 요법이 아닌 대증요법임에 유의한다.

2)만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.

①장기 투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능 검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 한다.

②약물요법이외의 치료법도 고려한다.

3)급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.

①급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.

②원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피한다.

③원인요법이 있으면 그것을 실시한다.

4)환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의한다.

5)감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여한다.

6)다른 소염진통제와 병용투여는 피하는 것이 바람직하다.

7)고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의한다.

5.상호작용

쿠마린계 항응혈제(와르파린)와 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여한다.

6.임부, 수유부, 어린이에 대한 투여

1)임부, 수유부에 대한 안정성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.

2)어린이 용량은 설정되어 있지 않으므로 12세이하의 어린이에게 투여하지 않는다.

7.경고

1)매일 세잔이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.

【저장방법】 차광, 기밀용기

제조번호 :

사용기한 :

MIRAE 미래제약주식회사
MIRAE PHARM. KOREA CO., LTD.
본사/공장 경기도 안성시 신소현동 137

KGMP 적격업체제품