KOREA GOOD MANUFACTURING PRACTICE
우수의약품 제조지정업체
KGMP

전문의약품
분류번호 : 641

항원충제

티니다진정 150mg 500mg

티니다졸

티니다진정150mg, 500mg정은 Trichomonas Vaginalis 등 기생성 원생동물로 인한 감염증에 경구 치료약으로 사용되는 새로운 약물입니다.

1916년 Hohne씨가 Trichomonas Vaginalis가 질염의 원인이 됨을 보고한 이래 Trichomonas 감염증 치료는 국소치료에만 의존하는 만족스럽지 못한 것이었으며 요로 생식기 등의 심부조직 감염에는 국소요법으로 약효가 미치지 못하기 때문에 재발률이 높았습니다.따라서 경구 투여에 의한 새로운 전신요법을 기대하게 되었습니다.

이와 같은 기대에 부흥하여 1959년 이후 수종의 Imidazole유도체가 발견되었고 경구적으로 투여하여 우수한 약효를 발휘하였습니다.

티니다진정150mg, 티니다진500mg정은 Imidazole유도체 중의 하나로 우수한 항원충제입니다.

【성분 · 함량】

티니다진정 150mg : 1정 중
티니다졸(Tinidazole)(식약청고시) ····· 150mg
(황색4호(타르트라진)함유)
티니다진정 500mg : 1정 중
티니다졸(Tinidazole)(식약청고시) ····· 500mg
(황색4호(타르트라진)함유)

【성　　상】

티니다진정 150mg : 황색의 원형 필름코팅정
티니다진정 500mg : 황색의 타원형 필름코팅정

【약 리 작 용】

1. 항 트리코모나스 작용
   티니다진은 특히 여성과 남성의 비뇨생식기의 트리코모나스 감염증에 경구투여로 우수한 효과를 발휘합니다.트리코모나스 감염이 확인되었거나 의심스러우면 환자뿐만 아니라 재감염의 원인이되는 환자의 배우자도 같이 치료하는것이 필요합니다. 소수의 재치료를 요하는 완고한 감염증의 경우에 적절한 국소요법의 병행이 필요하며 Candida등의 감염여부를 가려 동시 치료가 요망됩니다.
2. 항 아메바 작용
   티니다진은 장관아메바증(아메바성 이질)이나 조직아메바증 (아메바성 간염, 간농양)에 우수한 약효를 나타내며 종래 항 아메바제보다 부작용이 경미합니다.
3. 트리코모나스성 요도염
   티니다진은 트리코모나스 감염에 의한 요도염, 전립선염, 정낭염에 우수한 약효를 나타냅니다.

【효능 · 효과】

1. 주효능 · 효과
   트리코모나스증, 아메바증(이질, 간농양, 간염), 지알디아증.
2. 다음 질환에도 사용할 수 있습니다.
   혐기성균 감염증.

【용법 · 용량】

1. **트리코모나스증 및 지알디아증**
   티니다졸로서 보통성인 2g을 1회 경구 투여하거나 1회 150mg을 1일 3회 5일간 또는 1회 150mg을 1일 2회 7일간 경구투여 하십시오.
   소아는 티나다졸로서 체중 kg당 50~75mg을 1회 경구 투여하십시오.
2. **아메바증**
   티니다졸로서 보통 성인 1일 1회 2g을 2~3일간 경구 투여하십시오.
   소아는 티니다졸로서 체중 kg당 50~60mg을 1일 1회 3일 경구 투여하십시오.
3. **혐기성균 감염증**
   티니다졸로서 보통 성인 초일 1회 2g, 다음부터 1일 1회 1g을 경구 투여하거나 1회 500mg을 1일 2회 경구 투여하십시오.수술후 감염 예방에는 수술 12시간 전에 2g을 1회 경구 투여하고 급성 궤양성 치육염에는 2g을 1회 경구 투여하십시오.
   연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. **다음 환자에는 투여하지 마십시오.**
   1) 본제 투여로 과민반응의 경력이 있는 환자.
   2) 혈액질환을 앓고 있거나, 앓았던 경력이 있는 환자.
   3) 기질적 신경질환 환자
   4) 임부, 수유부
2. **일반적 주의사항**
   1) 알코올성 음료와 병용시 흉통, 홍조, 구토를 일으킬 수 있습니다.
   2) 현기증, 조절장애 및 운동실조와 같은 신경성장애를 일으킬 수 있으므로 투약중에 비 정상적인 신경증상이 나타나면 투약을 중단하십시오.
3. **부작용**
   1) 소화기계 : 때때로 오심, 구토, 식욕결핍, 설사, 설태가 나타날 수 있습니다.
   2) 과민반응 : 때때로 발적, 담마진, 소양증, 맥관신경증성 부종이 나타날 수 있습니다.
   3) 혈액 : 약물 알러지 반응으로 여겨지는 부종, 관절팽창 같은 혈액질환 증상이 나타날 수 있고 일시적 백혈구 감소등이 나타날 수 있습니다.
   4) 생식기 : 본제 투여중 칸디다성 질염이 나타날 수 있습니다.
   5) 기타 : 때때로 두통, 두중, 권태감, 구갈, 뇨의변색(흑변)이 나타날 수 있습니다.

4.과량투여

과량투여시 특별한 치료법은 없지만 위세척등의 응급처치를 하도록 합시다.

5. **적용상의 주의**
   본 제제는 황색 4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알러지 경력이 있는 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의 하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 3년

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

■연락처 : 개발부 (02)2242-0491

신일제약주식회사
충청북도 충주시 앙성면 본평리 산5-1
http://www.sinilpharm.com

작성년월일 : 2001.5.24