KOREA GOOD MANUFACTURING PRACTICE 우수의약품 제조지정업체 KGMP

일반의약품

분류번호 : 222

진해 · 거담제

신일 염산 브롬헥신정

Bromhexine · HCl Tabs.

신일 염산브롬헥신정은 동인도산의 생약 Adhatoda Vasica의 유효성분 Vasicine을 기초로 하여 합성된 벤질아민계의 신약으로 객담의 제거, 진해 및 호흡 촉진작용을 하므로 호흡기관 질환의 치료에 종합적인 효과를 발휘하는 이상적인 진해 · 거담제입니다.

신일 염산브롬헥신정은 경구적으로 투여시 신속하게 흡수되어 약 30분 후부터 약효를 나타내며 약효의 지속시간은 6~10시간입니다.

【성분 · 함량】 (1정 중)

염산브롬헥신(Bromhexine · HCl) (약전)····· 8 mg

【성　　상】 황색 원형 정제(황색4호(타르트라진) 함유)

【약리작용 및 특장】

- **우수한 거담효과를 발휘합니다.**
  신일 염산브롬헥신정은 기관지로부터 수분 분비를 촉진하여 객담의 점도를 저하시키고 담(가래)의 배출을 용이하게 하여 우수한 거담 효과를 발휘합니다.
- **우수한 진해작용을 나타내고 호흡을 용이하게 하여 줍니다.**
  신일 염산브롬헥신정은 기도내에 저류된 분비물을 용이하게 제거하면서 기도를 보호하고 기관지염증을 완화시켜 진해작용을 발휘할 뿐만 아니라 기도의 점성 저항을 저하시켜 호흡을 용이하게 하여 줍니다.

【효능 · 효과】

1. 주효능 · 효과
   다음질환에서의 객담배출곤란 : 급 · 만성기관지염, 폐결핵, 진폐증, 수술후, 기관지 확장증

【용법 · 용량】

성인 : 1회 1~2정 1일 3회 경구투여하십시오.

소아 : 6~14세 1회 ½~1정 1일 2~3회, 6세 미만 1회 ½정 1일 1~2회 투여하십시오.

연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. **다음 환자에는 투여하지 마십시오.**
   이 약 혹은 이 약의 첨가제에 과민증이 있는 환자

2. **다음 환자에는 신중히 투여하십시오.**
   1) 위궤양 환자
   2) 이 약에 과민증 환자
   3) 중증 신장애 환자
3. **부 작 용**
   1) 소화기계 : 구역, 식욕부진, 위부불쾌감, 복통 등이 나타날 수 있습니다.
   2) 정신신경계 : 때때로 두통이 나타날 수 있습니다.
   3) 과민증 : 발진, 호흡곤란, 일시적 오한 등이 나타날 경에는 투여를 중지하십시오. 알러지 반응으로 매우 드물게 기관지경련, 혈관부종, 아나필락시스가 나타날 수 있습니다.
   4) 기타
      ① 드물게 혈담이 나타날 수 있습니다.
      ② 동물실험에서 장기간 다량을 연속투여할 경우 혈청중에 아미노전이효소치와 객담량이 일시적으로 상승한다는 보고가 있습니다.
      ③ 객담량의 일시적 증가는 환자가 불안감을 호소할 수 있습니다.
4. **상호작용**
   에리스로마이신, 세팔렉신, 세푸록심, 아목시실린, 독시사이클린, 옥시테트라사이클린 등의 항생물질과 병용투여할 경우 폐조직에서의 항생물질의 작용을 증가시킬 수 있습니다.
5. **임부에 대한 투여**
   임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
6. **수유부에 대한 투여**
   이 약은 모유로 분비되므로 수유부에 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
7. **고령자에 대한 투여**
   일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.
8. **과량투여시의 처치**
   과량투여로 인한 증상은 보고되지 않았으나, 발생시 적절한 처치를 하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 3년

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

■ **연락처 : 개발부 (02)2242-0491**

신일제약주식회사
충청북도 충주시 앙성면 본평리 산5-1
http : //www.sinilpharm.com

개정년월일 : 970120