KOREA GOOD MANUFACTURING PRACTICE
우수의약품
제조지정업체
KGMP

일반의약품
분류번호 : 313

손발저림 · 어깨결림 · 신경통증

메코민 캅셀

말초신경장애치료제

손발이 저리거나 어깨결림, 마비감, 귀울림 및 신경통증의 주원인은 말초신경계 일부의 손상에 의해 나타나며 주로 40~60세 여성에게서 많이 나타납니다.

말초신경 손상으로 인한 이러한 증상은 방치하면 밤잠을 이루지 못할 정도로 심해지므로 적극적인 초기치료가 중요합니다.

메코민캅셀은 비타민 B_{12} 동족체 중에서 체내 활성형이 가장 높은 메코발라민 제제로서 신경세포내의 핵산, 단백질 및 인지질의 합성을 촉진하여 손상된 신경조직을 재생시키며, 비타민 B_{12} 결핍에 의한 조혈계의 이상을 개선하여주는 **말초신경장애 및 악성 빈혈치료제**입니다.

【성분 · 함량】 1캅셀 중

메코발라민(Mecobalamin) (J.P.) ····· 500㎍

【성　　상】 분홍색 분말이 든 상-적색, 하-살색의 경질캅셀제

【약리작용 및 특장】

1. 손상된 신경조직을 재생시켜 당뇨병성 신경합병증, 손발저림 · 어깨결림 · 신경통증 등의 말초신경장애를 근본적으로 치료합니다.

메코민캅셀은 당뇨병, 디스크 등에 의해 손상된 신경세포를 재생시켜 손발저림, 어깨결림, 마비감, 귀울림, 신경통증, 보행곤란 등의 말초신경장애를 근본적으로 치료합니다.

2. 신경세포내에 고농도로 이동, 분포하여 손상된 신경을 재생합니다.

메코민캅셀은 신경세포내에 고농도로 이행하여 핵산, 단백질 및 인지질의 대사를 개선시킵니다. 또한 메칠기를 주고받는 신경세포 합성과정에서 핵심기능을 발휘하여 손상된 신경을 재생시켜 줍니다.

3. 고효율의 악성 빈혈 치료제입니다.

비타민 B_{12}가 결핍되면 핵산(核酸) 합성 장애로 악성 빈혈(거적아구성 빈혈)이 나타나게 됩니다.

메코민캅셀은 비타민 B_{12}의 생리활성형으로 생체내 이용률이 높으며 혈중에서 장시간 고농도를 유지하므로 비타민 B_{12}결핍에 의한 악성 빈혈의 치료에 우수한 효과를 나타냅니다.

【효능 · 효과】

●비타민 B_{12} 결핍에 의한 거적아구성 빈혈

●말초성 신경장애

【용법 · 용량】

보통 성인 1일 3캅셀(메코발라민으로서 1일 1,500㎍)을 3회로 분할하여 복용하십시오.
연령 및 증상에 따라 적절히 증감할 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 일반적 주의
   효과가 나타나지 않는데도 한 달 이상 계속 사용하는 것은 피하는 것이 좋습니다.
2. 부작용
   1)소화기 : 때때로 식욕부진, 구역, 설사등의 증상이 나타나는 경우가 있습니다.
   2)피　부 : 드물게 발진이 나타나는 경우가 있습니다.
3. 기 타
   수은 및 수은 화합물을 취급하는 직업 종사자에 장기간 과량 투여하는 것은 피하는 것이 좋습니다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 3년

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

■연락처 : 생명과학서울연구소 (02)2242-0491~9

코스닥등록기업
신일제약주식회사
http://www.sinilpharm.com

개정년월일 : 2002.11.04