KOREA GOOD MANUFACTURING PRACTICE
우수의약품 제조지정업체
KGMP

전문의약품
분류번호 : 122

근육통 · 요통 · 디스크 치료제

마오릭스 125mg/250mg 정

카르바민산 클로르페네신 125mg/250mg

청장년의 남성들에게 많은 디스크나 가사일로 허리를 많이 쓰는 주부들의 요통, 심한 운동 뒤의 근육통은 외상(外傷)이나 과로, 잘못된 자세, 과격한 운동, 노화로 인한 척추의 변형등 여러 원인에 의해 척추의 신경이 자극을 받아 일어나는 것입니다.

마오릭스 정은 중추신경계에 대한 부작용을 개선한 중추성 근이완제로서, 척추의 다시냅스경로의 개재뉴우런을 선택적으로 차단하여 지속적인 근이완작용을 나타냅니다.

【성분 · 함량】 (1정 중)

마오릭스정 125mg
카르바민산클로르페네신(약전) ····· 125mg
마오릭스정 250mg
카르바민산클로르페네신(약전) ····· 250mg

【성　　상】

마오릭스정 125mg – 백색의 원형정제
마오릭스정 250mg – 주황색의 원형 필름코팅정

【약리작용 및 특장】

1. 척수에 선택적으로 작용하여 근이완작용을 나타냅니다.
   마오릭스 정은 골격근(骨格筋)의 긴장을 지배하는 척수의 다시냅스 반사경로(多시냅스反射經路, polysynaptic reflex arc)에 선택적으로 작용하여 개재 뉴우런(在 뉴우런, interneurone)을 억제하므로서 이상항진된 근육의 긴장을 해소하여 근이완작용을 나타냅니다.
2. γ-뉴우런에 대한 억제작용을 나타냅니다.
   마오릭스 정은 근방추(근육의 수축과 이완을 담당하는 기구로 근육내에 위치함)의 감도조절을 하는 γ-뉴우런을 억제하여 근방추로부터의 자극을 감소시키므로서 간접적인 근이완작용을 나타냅니다.
3. 근육통(筋肉痛)에 대한 완화한 진통작용을 나타냅니다.
   마오릭스 정은 일반적인 진통제는 아니지만 종래의 근이완제는 달리 근육통에 대한 진통작용을 나타내며, 이 진통효과는 아스피린보다 우수합니다.
4. 중추신경계에 대한 부작용이 적습니다.
   마오릭스 정은 종래의 근이완제와는 달리 치료용량에서 상위 중추신경계를 억제하지 않으므로 각성수준(覺醒水準)의 저하, 진정작용, 호흡억제 등의 중추신경계에 대한 부작용이 적습니다.
5. 저투여량에서 정확하고 지속적인 효과를 나타냅니다.
   마오릭스 정은 메토카르바몰(methocarbamol)의 1/2용량으로도 정확한 근이완작용을 나타내며, 복용후 신속히 흡수되어 타 근이완제보다 지속적으로 작용합니다.

【효능 · 효과】

근골격계질환에 수반하는 동통성 연축 : 요배통증, 변형성척추증, 추간판헤르니아, 척추분리 · 전위증, 척추골다공증, 경견완증후군.

【용법 · 용량】

성인 : 카르바민산클로르페네신으로서 1회 250mg을 1일 3회 경구투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약 및 유사화합물(메토카르바몰 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
   2) 간장애 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 간장애의 병력이 있는 환자
   2) 신장애 환자
3. 부 작 용
   1) 과민증 : 때때로 발진, 부종 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
   2) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 드물게 두통 · 두중감, 무력 · 권태감 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 하십시오.
   3) 소화기계 : 때때로 구역 · 구기, 위통, 위부불쾌감, 위정체감, 식욕부진, 구갈 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   4) 혈액 : 드물게 백혈구감소, 혈소판감소 등이 나타날 수 있습니다.
4. 일반적 주의
   1) 졸음, 주의력 · 집중력 · 반사운동 능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이 약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.
   2) 장기간 투여한 경우의 안전성이 확립되어 있지 않으므로 장기간 투여시에는 임상검사(혈액검사, 요검사 및 간기능검사 등)을 하는 것이 바람직합니다.
5. 상호작용

   다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 이러한 경우에는 투여하지 않는 것이 바람직하지만 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 신중히 투여하십시오.

   페노치아진계 약물(클로르프로마진 등), 중추신경억제제(바르비탈계 약물 등), MAO저해제
6. 임부 및 수유부에 대한 투여
   1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상 유익성이 위험성을 상회한다고 판단된 경우에만 투여하십시오.
   2) 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
7. 소아에 대한 투여

   유 · 소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
8. 고령자에 대한 투여

   일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 3년

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

■ 제품문의 (02)2242-0491~9

코스닥등록기업
신일제약주식회사
http://www.sinilpharm.com

종이
분리배출

개정년월일 : 2003.6.23