KOREA GOOD MANUFACTURING PRACTICE 우수의약품 제조지정업체 KGMP

일반의약품

분류번호 : 233

가스제거제 함유 복합소화제

판디탈정

(PANDITAL Tabs.)

판디탈정은 인체가 생리적으로 필요로 하는 소화효소 판크레아틴(pancreatin)과 우담즙엑스(oxbile ext.), 헤미셀룰라제(hemicellulase) 및 위부팽만감, 상복부통증 등의 원인이 되는 장내 가스를 제거시켜주는 디메치콘(Dimethicone)이 균형있게 배합된 종합 소화효소제입니다.

【성분 · 함량】 (1정 중)

판크레아틴 (별규) ····· 175mg
(아밀라제 4,200 F.I.P 단위)
(리 파 제 5,367 F.I.P 단위)
(프로테아제 222 F.I.P 단위)
우담즙엑스 (식약청고시) ····· 25mg
(콜린산으로서 ····· 11.25mg)
디메치콘 (엔.에프.) ····· 25mg
헤미셀룰라제 (별규) ····· 50mg
(125 헤미셀룰라제 단위)

【성　　상】 장방형의 녹색 당의정

【약리작용 및 특장】

1. 소화기능을 정상화시키는 소화효소
   · 판크레아틴 : 아밀라제, 리파제, 프로테아제가 함유된 소화효소제로 탄수화물, 지방, 단백질의 소화 및 흡수를 촉진시켜줍니다.
   · 우담즙엑스 : 흡수된 후 담즙량을 증가시켜 담즙분비 촉진작용(이담작용)을 보임으로써 지방의 소화와 흡수를 촉진시킵니다.
   · 헤미셀룰라제 : 인체에서 분비되지 않는 섬유질 성분분해 소화효소제로 원활한 소화과정이 되도록 도와줍니다.
2. 가스제거
   디메치콘은 가스제거제로서 속이 더부룩하고 불쾌해지는 등의 복부팽만감, 위부불쾌감 및 가스로 인한 상복부 통증 등의 장내에 가스가 차서 생기는 증상을 신속히 제거하여 줍니다. 또한 방사선 검사시 장해요인이 되는 가스를 제거 시켜주므로 방사선 검사 전 필수 보조로 응용됩니다
3. 소화촉진
   판디탈정은 소화에 필요한 성분들이 균형있게 배합된 종합 소화효소제로서 과음, 과식으로인한

소화불량, 간 및 췌장의 기능부전으로 오는 만성 소화불량, 고장성 소화불량 등의 소화불량 개선에 좋은 제제입니다.

4. 채식위주의 한국인의 식생활에도 적합한 종합소화효소제

판디탈정은 탄수화물, 단백질의 소화흡수를 촉진시키는 판크레아틴 및 우담즙 엑스외에 인체에서 분비되지 않는 섬유질 성분 분해 소화효소인 헤미셀룰라제가 배합되어 있어 섬유질이 많은 채식을 주로 하는 한국인의 식생활에 적합한 종합소화효소제입니다.

【효능 · 효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 방사선 검사전의 가스제거

【용법 · 용량】

성인 1회 1-2정 1일 3회 식후에 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

   다른 약물을 투여받고 있는 환자

2. 일반적 주의

   1) 정해진 용법 · 용량을 지키십시오.

   2) 2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

3. 소아에 대한 투여

   이 약은 7세 이하의 영 · 유아에게 투여하지 마십시오.

4. 저장상의 주의사항

   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

   2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.

   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

5. 적용상의 주의

   본 제제는 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알러지 경력이 있는 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 3년

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

■ 제품문의 (02)2242-0491~9

코스닥등록기업
신일제약주식회사
http://www.sinilpharm.com

종이
분리배출

개정년월일 : 2003.7.24

■ **성분 · 함량** (1정 중)

판크레아틴(별규) ····· 175mg
(아밀라제 ····· 4,200F.I.P.단위)
(리파제 ····· 5,367F.I.P.단위)
(프로테아제 ····· 222F.I.P.단위)
우담즙엑스(식품의약품안전청고시) ····· 25mg
(콜린산으로서 11.25mg)
디메치콘(엔.에프.) ····· 25mg
헤미셀룰라제(별규) ····· 50mg
(125 헤미셀룰라제 단위)

■ **성　　상** : 장방형의 녹색 당의정

■ **효능 · 효과**

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 식체(위체), 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감, 방사선검사전의 가스 제거.

■ **용법 · 용량**

성인 1회 1~2정, 1일 3회 식후 복용하십시오.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음 환자는 신중히 투여하십시오.
   1) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
2. 일반적 주의
   1) 정해진 용법과 용량을 잘 지켜주십시오.
   2) 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의하십시오.

일반의약품　**1000정**　분류번호:233

종합 소화 효소제

판디탈정

PANDITAL Tabs.

코스닥등록기업
신일제약주식회사
http://www.sinilpharm.com

3. 소아에 대한 투여
   이 약은 7세이하의 영 · 유아에게는 투여하지 마십시오.
4. 저장상의 주의사항
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
   2) 직사일광을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
5. 적용상의 주의
   본 제제는 황색4호(타르트라진) 를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알러지 경력이 있는 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

■ **저장방법** : 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

본사 : 서울특별시 동대문구 장안 2동 315-18
공장 : 충청북도 충주시 앙성면 본평리 산 5-1본사

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

■ 제품문의 (02)2242-0491~9

8 806109 520713

제 조 번 호 :

사 용 기 한 :