KGMP

전문의약품

분류번호 : 123

대장근육기능이상 치료제

신일 브롬화옥틸로늄 정

Octylonium Bromide 20mg

신일브롬화옥틸로늄(Octylonium Bromide)정은 위 · 장관의 발작성 수축으로 오는 경련(Colvulsion)을 진정시켜주는 진경제(Antispasmodics)로서 정신적 스트레스와 심리적 불안감, 긴장으로 발병될 수 있는 과민성대장증후군 및 위 · 장관 경련증, 기능저하에 우수한 치료효과를 보이는 제제입니다. 또한 위 · 장관 평활근에 선택적으로 작용하므로 항콜린제와 같이 투여로 인한 전신성 부작용이 적어 복용부담이 적습니다.

【성분 · 함량】 (1정 중)

브롬화옥틸로늄(Octylonium bromide)
(식품의약품안전청고시) ····· 20mg

【성　　상】 연두색의 장방형 필름 코팅 정제.

【약리작용 및 특장】

◈ **브롬화옥틸로늄**은 위 · 장관 평활근의 근세포에 직접 작용하여 세포내로의 칼슘 이온이 과도하게 유입되는 것을 억제함으로써 수축된 근육의 긴장을 풀어주고 발작성 수축으로 인한 경련을 진정시켜주는 **진경제**입니다.

◈ 경구 투여 후 30분이 지나면서 부터는 설사 및 설사에 수반되는 복통, 변비, 복부팽만감이나 위부불쾌감 등의 **자각증상이 완화**되기 시작합니다.

◈ 진경작용이 지속적이며 과민성대장증후군, 위 · 장관 경련증, 기능저하증에 대한 치료 효과가 약90%이상인 우수한 제제입니다.

◈ 위 · 장관에 선택적으로 작용하므로, 자율신경계에 작용하는 항콜린제를 투여함으로써 수반될 수 있는 구갈, 시야몽롱, 현기증, 배뇨장애, 변비, 서맥 등의 전신성 부작용이 없습니다.

【효능 · 효과】

위장관 경련 및 과민성대장증후군

【용법 · 용량】

성인 : 브롬화옥틸로늄으로서 1회 20~40mg(1~2정)을 1일 2~3회 경구투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   이 약에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 녹내장 환자
   2) 본 제제는 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알러지 경력이 있는 사람은 신중히 투여하십시오.

【포 장 단 위】 60, 100, 200, 500, 1000정

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 3년

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

연락처 : 개발부 (02)2242-0491~9

신일제약주식회사
충청북도 충주시 앙성면 본평리 산5-1

개정년월일 : 990401