KOREA GOOD MANUFACTURING PRACTICE 우수의약품 제조지정업체 KGMP

전문의약품
분류번호 : 114

효과적인 소염진통제

신일 탈니플루메이트정

Talniflumate 370mg

신일 탈니플루메이트정은 niflumic acid의 에스테르제제로서 류마티양 관절염, 골관절염 등의 다양한 염증질환에 대한 우수한 항염효과가 널리 입증된 제제입니다.

【성분 · 함량】 (1정 중)
탈니플루메이트(식약청고시) ····· 370mg

【성　　상】 미황색의 원형 필름코팅정제

【약 리 작 용】
1. 항염작용이 우수합니다.
   Rat와 rabbit을 대상으로 실시한 항염증실험에서 niflumic acid에 비해 현저한 항염효과를 나타냅니다.
2. 위점막에 대한 영향이 적습니다.
   Rat의 위점막에 대한 탈니플루메이트는 직접적 영향을 거의 미치지 않으며 궤양유발작용 및 위자극 역시 미소함이 입증되었습니다.

【효능 · 효과】
1. 다음 질환에 사용할 수 있습니다.
   류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 좌골신경통, 무월경성 동통, 외상후 동통, 수술후 염증 및 동통, 건초염, 염좌, 자궁부속기염, 인두염, 편도염, 이염, 부비동염.

【용법 · 용량】
성인 : 1회 1정(탈니플루메이트로서 370mg)을 1일 3회 경구투여 하십시오. 중증일 경우에는 1회 2정(740mg)을 투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】
1. 경고
   매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있습니다.
2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
   1) 이 약에 과민증 환자
   2) 소화성궤양 또는 그 병력이 있는 환자
3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
   1) 간장애 환자
   2) 신장애 환자
4. 부작용
   1) 과민증 : 일반적으로 내성이 좋으나 과민증 환자는 구역, 구토가 일어날 수 있습니다.
   2) 소화기 : 장기투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장 출혈, 소화성궤양 및 천공이 나타날 수 있습니다.
5. 일반적 주의
   1) 소염 진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의하십시오.

2) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.
① 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사 (요검사, 혈액검사, 간기능 검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 하십시오.
② 약물요법이외의 치료법도 고려하십시오.
3) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려하십시오.
① 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여하십시오.
② 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피하십시오.
③ 원인요법이 있으면 그것을 실시하십시오.
4) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의하십시오.
5) 감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히하여 신중히 투여하십시오.
6) 다른 소염진통제와 병용투여는 피하는 것이 바람직합니다.
7) 고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의하십시오.

6. 상호작용
쿠마린계 항응혈제(와르파린 등)와 병용투여시 그 작용을 증강시킬 수 있으므로 감량하는 등 신중히 투여하십시오.

7. 임부, 수유부, 어린이에 대한 투여
1) 임부, 수유부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.
2) 어린이 용량은 설정되어 있지 않으므로 12세이하의 어린이에는 투여하지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온보관(1~30°C), 3년

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

■ 제품문의 (02)2242-0491~9

코스닥등록기업
신일제약주식회사
http://www.sinilpharm.com

종이
분리배출

개정년월일 : 2003. 11. 26