일반의약품 · 약전
분류번호 : 313

KGMP

조혈비타민제

신일 엽산정

Folic Acid 1mg

빈혈(Anemia)은 산소를 조직으로 운반하여 인체 조혈계의 항상성을 유지하는 적혈구의 순환량이 정상 범위 이하로 감소되어 조직내 산소결핍 상태를 초래하여 피부창백, 손톱의 변형, 피곤, 쇠약해지는 질환입니다.

신일 엽산(folic acid)정은 체내 적혈구 생성에 참여하는 필요한 뉴클레오티드(purine 및 pyrimidine)의 합성 등의 대사에 참여하는 FH_4(tetrahydro folate)로 환원되어 적혈구 생성(조혈)을 도와줍니다. 따라서 신일 엽산정은 엽산결핍성 뿐만 아니라 유 · 소아, 1차 간손상, 알코올중독, 알코올성 간경변, 장관 협착등으로 인한 거적아구성 빈혈 및 대적아구성 빈혈 등의 치료에 사용되는 조혈비타민제입니다.

【성분 · 함량】 (1정 중)

엽산(Folic Acid)(약전) ····· 1㎎

【성　　상】 황색의 원형정제

【효능 · 효과】

1. 주효능 · 효과
   엽산결핍증의 예방 및 치료 : 거적아구성빈혈(유소아, 임산부), 악성빈혈의 보조요법(비타민B_{12} 결핍으로 인한 빈혈제외), 엽산요구량이 증가하는 각종질환(임산부, 수유부, 유아소모성질환)
2. 다음 질환에도 사용할 수 있습니다.
   약물 투여로 인한 엽산결핍증(항경련제, 경구피임제, 항말라리아제), 알코올중독 및 간질환에 관련된 대적혈구성 빈혈, 흡수부전증, 골수염증, 골수 이상형인 고령환자.

【용법 · 용량】

1. 엽산결핍증, 타약물 투여로 인한 결핍증 치료 : 엽산으로서 보통 성인 및 소아에게는 1일 0.25~1㎎을 경구 투여하십시오.
2. 엽산결핍증 예방 및 엽산의 요구량이 증대하는 각종 질환 : 엽산으로서 보통 성인 및 소아 1일 0.1~0.25㎎을 경구 투여하십시오.
   단, 연령 및 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1) 부작용
   가) 때때로 홍반, 피부발진, 가려움증, 전신권태, 기관지에 의한 호흡곤란 등의 알레르기 증상이 나타날 수 있습니다.
   나) 때때로 식욕부진, 구토 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
   다) 부종, 때때로 체중감소 등이 나타날 수 있습니다.
2) 일반적 주의
   이 약은 악성빈혈이 있는 환자에 투여하면 혈액상태는 개선되지만 신경증상에 효과가 없으므로 악성빈혈의 환자에 투여하는 경우에는 비타민 B_{12} 제제와 병용하십시오.
   다만, 진단이 확립되지 않은 악성빈혈이 있는 환자의 경우에 혈액상태의 개선에 의한 악성빈혈을 은폐하고 진단 및 치료에 영향을 주게 됨으로 주의하십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온보관, 3년

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

■ 연락처 : 개발부 (02)2242-0491~9

신일제약주식회사
충청북도 충주시 앙성면 본평리 산5-1
http://www.sinilpharm.com

개정년월일 : 951218