KGMP

전문의약품 · 약선2
분류번호 : 313

비타민 B_6 제제

신일 피리독신 정

염산피리독신

피리독신(Pyridoxine)은 1935년 P. Gyorgy에 의하여 Vit. B 복합체의 한 인자임이 증명되었고, 자연중에는 효모, 배아, 간, 당분 등에 함유되어 있으나 이는 단백질 등과 굳게 결합하여 있으므로 체내에서의 소화 · 흡수되기가 극히 어렵습니다.

피리독신(Pyridoxine)은 항피부염인자로서 이의 결핍은 피부염, 급 · 만성습진, 구순염 등을 일으킬 뿐만 아니라 특히 화학요법제나 항생제 등에 의한 결핍증상으로 신경장애를 유발하기도 합니다.

신일피리독신정은 아미노산의 산화 · 합성에 필수적인 보효소 제제로서 각종 결핍증상의 치료제로 임상가들에게 널리 사용되는 비타민 B_6제제입니다.

【성분 · 함량】 1정 중
염산피리독신(Pyridoxine HCl : Vitamin B_6) (약전) … 50㎎

【성　　상】 백색의 원형정제

【약 리 작 용】

1. 피리독신은 생체내에서 피리독신(Pyridoxine), 피리독살(Pyridoxal), 피리독사민(Pyridoxamine)의 3가지 형태로 상호 변환하여 존재하며 아미노산의 탈탄산반응, 아미노기 전이, 라세미화에 관여하는 필수적인 보효소입니다.
2. 아미노산의 세포막으로의 이동,불포화지방산의 합성 및 트립토판(Tryptophan)의 니코틴산(Nicotinic Acid)으로의 변환 등에도 관여합니다.
3. 피리독신의 결핍은 피부의 특이적 장애와 신경증상을 유발합니다.

【효능 · 효과】

1. 주효능 효과
   (1) 비타민 B_6 결핍증의 예방 및 치료.
   (약물 투여로 인한 결핍 포함. 예 : 이소니아지드)
   (2) 비타민 B_6 의 수요가 증대하여 음식중에서 섭취가 불충분할 경우의 보급(소모성 질환, 임산부, 수유부 등)
   (3) 비타민 B_6 의존증(비타민 B_6 반응성 빈혈 등)
2. **다음 질환에도 사용할 수 있습니다.**
   비타민 B_6 결핍 또는 대사장애가 관여한다고 추정되는 경우의
   (1) 구각염, 구순염, 설염
   (2) 급 · 만성습진, 지루성습진, 접촉성피부염
   (3) 말초신경염
   (4) 방사선장애(숙취)
   (5) 경구피임제(Estrogen 및 Progesteron) 사용시 우울증.

【용법 · 용량】
염산피리독신으로서 보통 성인 1일 10~100㎎을 경구투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감 하십시오.
희귀한 예이나 비타민 B_6 의존증의 경우에는 대량 투여를 요하는 수도 있습니다.

【사용상의 주의사항】
지시된 용법 · 용량의 범위내에서는 안전하게 사용할 수 있으나 유효하리라고 추정되는 적응증에 대해서는 효과가 없는데 막연히 월여에 걸쳐 장기 투여할 필요는 없습니다.

【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 3년

※사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품은 약국등의 개설자에 한하여 당사 담당 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.

■ **연락처 : 개발부 (02)2242-0491~9**

신일제약주식회사
충청북도 충주시 앙성면 본평리 산5-1
http://www.sinilpharm.com

개정년월일 : 971001