

28045M10808
국산의약품
제조자협회
KGMP

전문약품
분류번호 : 122

중추성 근이완제
마오릭스정
클로르페네신카르바메이트

현대인은 육체적이나 정신적인 각종 원인에 의해 근육이 과도하게 긴장하여 근육이 쑤시고 허리과 등이 빠근하고 걸리는 등 긴장성 근육통질환이 자주 발생하여 신체적으로 많은 고통을 받고 있습니다.

마오릭스정(카르바민산클로르페네신)은 중추신경계에 대한 부작용을 개선한 중추성 근이완제로서 지속적인 근이완작용을 하는 동시에 골격근에 통증을 효과적으로 진통작용을 하는 근육통, 요통, 디스크 전문치료제입니다.

【성분·함량】(1정 중)

- 마오릭스정 125mg
클로르페네신카르바메이트(Chlorphenesin Carbamate)(케이.피.).....125mg
- 마오릭스정 250mg
클로르페네신카르바메이트(Chlorphenesin Carbamate)(케이.피.).....250mg

【성상】

흰색의 원형정제

【약리작용 및 특징】

- 척수에 선택적으로 작용하여 근이완작용을 합니다.
마오릭스정은 골격근의 긴장을 지배하는 척수의 다 시냅스 반사경로에 선택적으로 작용하여 개재 뉴론을 억제하므로써 이상 항진된 근육의 긴장을 해소하여 근이완작용을 합니다.
- γ -뉴론에 억제작용을 합니다.
마오릭스정은 근방추(근육의 수축과 이완을 담당하는 기구로 근육내에 위치함)의 감도조절을 하는 γ -뉴론을 억제하여 근방추로부터의 자극을 감소시키므로써 간접적인 근이완작용을 합니다.
- 근육통에 진통작용을 합니다.
마오릭스정은 일반적인 진통제는 아니지만 종래의 근이완제는 달리 근육통에 대한 진통작용을 나타내며, 이 진통효과는 아스피린보다 우수합니다.
- 중추신경계에 부작용이 적습니다.
마오릭스정은 종래의 근이완제와는 달리 치료용량에서도 상위 중추신경계를 억제하지 않으므로 각성수준의 저하, 진정작용, 호흡억제 등의 중추신경계에 부작용이 적습니다.
- 저투여량에서 정확하고 지속적인 효과를 나타냅니다.
마오릭스정은 메토카르바몰의 1/2용량으로도 정확한 근이완작용을 나타내며, 복용후 신속히 흡수되어 다른 근이완제보다 지속적으로 작용합니다.

【효능·효과】

근골격계질환에 수반하는 동통성 연속 : 요배통증, 변형성 척추증, 추간판 헤르니아, 척추분리·전위증, 척추골다공증, 경관완증후군.

【용법·용량】

성인 : 카르바민산클로르페네신으로서 1회 250mg을 1일 3회 경구투여하십시오.
연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
1) 이 약 및 유사화합물(메토카르바몰 등)에 과민증의 병력이 있는 환자
2) 긴장에 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 긴장장애의 병력이 있는 환자
- 2) 신장에 환자

3. 부작용

- 1) 과민증 : 때때로 발진, 부종 등이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 2) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 드물게 두통·두중감, 무력·권태감 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 경우에는 감량 또는 투여중지 등 적절한 처치를 하십시오.
- 3) 소화기계 : 때때로 구역·구기, 위통, 위부불쾌감, 위정체감, 식욕부진, 구갈 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 4) 혈액 : 드물게 백혈구감소, 혈소판감소 등이 나타날 수 있습니다.

4. 일반적 주의

- 1) 졸음, 주의력·집중력·반사운동 능력 등의 저하가 나타날 수 있으므로 이약을 투여중인 환자는 자동차 운전 등 위험을 수반하는 기계조작을 하지 않도록 주의하십시오.
- 2) 장기간 투여한 경우의 안전성이 확립되어 있지 않으므로 장기간 투여시에는 임상검사(혈액검사, 요검사 및 간기능검사 등)를 하는 것이 바람직합니다.

5. 상호작용

다음 약물과의 병용 또는 음주에 의하여 상호작용이 증강될 수 있으므로 이러한 경우에는 투여하지 않는 것이 바람직하지만 부득이하게 병용하는 경우에는 감량하는 등 신중히 투여하십시오.

페노치아진계 약물(클로로프로마진 등), 중추신경억제제(바르비탈계 약물 등), MAO저해제

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상 유익성이 위험성을 상회한다고 판단된 경우에만 투여하십시오.
- 2) 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

7. 소아에 대한 투여

유·소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에서는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의하십시오.

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 3년

【포장단위】

마오릭스정 125mg : 100T, 1000T

마오릭스정 250mg : 100T, 1000T

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 “소비자 피해보상 규정”에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, sinilpharm.com

코스닥상장
신일제약(주)



분리배출

설명서 개정년월일 : 2008. 7. 18