

잇몸질환치료제

덴스민 캡슐

Densmin Cap.

덴스민 캡슐은 치조농루·치은염에 의한 잇몸출혈, 발적, 부기, 고름 등에 꼭 필요한 4가지 성분의 복합제 제로서 잇몸질환을 일으키는 세균을 살균하고 염증을 신속히 분해시키며, 잇몸 조직에 분포되어 있는 모세혈관의 벽을 강화하여 출혈증상을 억제하고, 손상된 잇몸조직의 재생을 촉진하는 작용이 있어 잇몸질환의 원인 및 재발 증상들을 제거해주므로써 건강한 잇몸을 유지하도록 도와줍니다.

[원료약품 및 분량] 1캡슐중

염화리소짐(K.P.C)	30mg
아스코르빈산(K.P)	150mg
초산토코페롤50%(K.P.C)	10mg
(dl- α 초산토코페롤로서 5mg)	
카르바조크롬(K.P.C)	2mg
옥수수전분(K.P)	80mg

[성상] 주황색의 분말이 든 상, 하 녹색의 경질캡슐

[약리작용 및 특징]

1. 덴스민 캡슐은 잇몸질환 원인균에 대한 직접적인 살균 및 소염효과가 있어 염증을 신속히 분해제거하므로써 손상된 조직의 재생을 촉진합니다.
2. 덴스민 캡슐은 모세혈관의 저항성을 증강시키고 혈관 투과성을 억제하므로써 잇몸 출혈 억제 및 지혈을 촉진합니다.
3. 덴스민 캡슐은 잇몸조직의 혈액순환을 원활히 하므로써 손상된 잇몸조직에 충분한 수분을 공급하고, 순환 부전으로 인한 발적 및 부종을 완화시킵니다.
4. 덴스민 캡슐은 모세혈관 및 치조연골조직, 잇몸조직의 구성성분인 Collagen의 생합성을 촉진함으로써, 모세혈관벽을 강화하여 상처부위의 출혈을 억제하고 손상된 잇몸조직의 재생을 촉진해 줍니다.

[효능·효과]

치은염·치조농루에 의한 여러증상(잇몸의 발적, 부기, 출혈, 통증)의 완화

[용법·용량] 성인 1회 1캡슐, 1일 3회 식후에 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 약 및 화장품 등으로 알레르기 증상(발진, 발적, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
 - 2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
 - 3) 지금까지 약이나 달걀에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 일이 있는 환자
2. 부작용
 - 1) 이 약을 투여함으로써 발진, 발적, 설사, 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 구내염 등이 나타날 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사(치과의사)와 상의하십시오.
 - 2) 피부 : 스티븐스-존슨 증후군(피부점막안증후군), 리엘 증후군(중독성표피괴사증)이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 발열, 홍반, 가려움, 안출혈, 구내염등의 증상이 인정되는 경우 및 고열을 동반하는, 발진, 발적, 화상양의 수종 등의 중증의 증상이 전신의 피부, 입과 목의 점막에 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 의사 또는 약사와 상의한다. 또한 드물게 이와 같은 중증의 증상을 일으키는 경우에는 즉시 의사의 진료를 받는다.
3. 일반적주의
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 1개월 이상 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사(치과의사)와 상의하십시오.
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 2) 직사광선을 피하고, 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
 - 3) 오용을 막고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

※ 본제품은 우수약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만일 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환해 드립니다.

DESC 2007-07

판매원

 **영진약품공업주식회사**
서울특별시 강동구 천호3동 451-20

제조원

PHARVIS (주) 한국파비스바이오테크 
BIOTECH KOREA
377-10, 215-1, Danwon-ro, Seongnam-si, Kyunggi-do
소재지: 서울특별시 강남구 테헤란로 377-10, 215-1, 031-491-7978