



효과빠른 해열·진통제

암타나정

10정

일반의약품

■원료약품 및 분량 : 1정중

만델산벤질(D.A.B)	50mg
아세트아미노펜(K.P)	200mg
이소프로필알티피린(K.P)	200mg
카페인(K.P)	50mg

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 사람은 복용하지 말 것.
1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상에 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
2. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것
1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움 등)을 일으킨 적이 있는 사람
3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영·유아 및 어린이(14세 이하)
- 4) 간장질환, 신장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람과 고열이 있는 사람
- 5) 고령자
- 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
3. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것
1) 용병 용량을 잘 지켜라 것
2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것: 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등
3) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것
4. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것.
1) 복용하는 동안 고열을 동반하고, 발진, 발적, 화상 모양의 수포 등 심한 증상이 전신피부, 입과 눈의 점막에 나타나거나 또는 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
2) 복용하는 동안 속증상, 혈액장애 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

의약품분류번호: 114

■효능·효과

두통, 치통, 발치후 통증, 인후통, 귀의통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통, 타박통, 골절통, 염좌통, 월경통(생리통), 외상통의 진통, 오한, 발열시의 해열

4) 장기 연용하지 말 것

- 5) 이 약 복용후 가슴이 답답하고 인면창백, 수족냉증, 발한, 호흡곤란 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 6) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것. ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수축이 차가워지고, 식은땀 흘림 등이 나타나는 경우 ② 고열을 수반하여 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우 ③ 천식이 나타난 경우
- 7) 바르빌레트 약물, 심한게 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.
5. 보관 및 취급상의 주의
1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것
3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

★ 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이거나 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상 및 위장출혈이 유발될 수 있다.

※ 본 제품은 우수의약품 제조관리 및 품질 관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만일 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견된 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환해 드립니다.

AMNT 2008-03

(주)한국파비스바이오텍

경기도 안산시 단원구 목내동 456-3
소보자상당실 031) 491-7178



문리배출

■성상 : 미홍색의 정방형정제

■용법·용량 : 성인 1회 1정, 1일 3회 까지 공복시를 피하여 복용합니다. 복용간격은 4시간 이상으로 합니다.

■저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

