

1캡슐

일반의약품
번호: 316

자양강장 피로회복

파워비타

연필
캡슐

POWERVITA



분리배출



■ 원료약품 및 그분량: 에 약 1캡슐 (1,150mg) 중 니코틴아미드(약전) 20mg/ 리보플라빈(약전) 3mg/ 아스코르빈산(약전) 75mg/ 엽산치아민(약전) 2mg/ 에르고칼시페롤(약전) 400IU/ 불미현산칼슘(약전) 5000IU/ 파라옥시안식당산에틸(약전) 0.48mg/ 파라옥시안식당산프로필(약전) 0.12mg

■ 성분: 정제의 내용물이 충전된 밀봉 알루미늄 박막의 정제의 포장형의 연필캡슐

■ 효능·효과: 다량풍후의 비타민 보급: 여약제, 식욕부진, 영양불량, 소모성 질환, 폐색전, 병후, 병후의 회복, 치매, 임신, 수유기, 폐색기 및 노년기

제조업체

HB 안홀제약주식회사

경기도 안성시 일죽면 반재리 40-8



제조번호: 42007003

사용기한: 2010.0726

POWERVITA

SOFT
CAPSULE

■ 용법·용량: 성인 1회 1캡슐, 1일 1회 복용

■ 사용상의 주의사항

1. 경고: 임신부에 비타민A(레티놀) 1일 권장량(8,000IU) 이상 투여하는 경우에는 신장장기 기능을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 말 것. (비타민A 결핍증 환자는 제외)
 2. 다른 사람은 복용전에 의사 또는 약사와 상의 할 것. (1) 1세 미만의 유아, (2) 의사의 처방을 받고 있는 사람, (3) 임신부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
 3. 복용시에는 다른 사항에 주의할 것. (1) 장애전 용법, 용량을 지킬 것. (2) 소아에 복용시킬 경우에는 부모의 지도감독하에 복용할 것. (3) 이 약은 내복으로만 사용하고 주사용으로는 사용하지 말 것. (4) 본 제제에 함유한 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조용법의 용량은 비타민A로서 1일 8,000IU 이상을 넘지 않도록 할 것.
 4. 복용중 또는 복용후 다음 사항에 주의 할 것. (1) 본제의 복용에 의해 구토, 구역, 설사, 가려움증의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의 할 것. (2) 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선되지 않으면 의사 또는 약사와 상의 할 것.
 5. 임부에 대한 투여 (1) 외국에서 임신한 3개월로부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부산공변증을 중심으로 하는 기형발현 경우가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신중의 임하는 부인에는 비타민A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외 하고는 이 약을 투여하지 말 것. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우에는 식별 중으로 부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 대한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 기울일 것.
 6. 저장상의 주의사항. (1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다. (2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여 보관한다. (3) 오용을 막고 불필요의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다. 개정연월일 2001. 08. 01
- 저장방법: 차광밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약, 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변태, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 경로를 통하여 교환하여 드립니다.

제조업체

HB 안홀제약주식회사

본사: 서울 중구 구로동 135-3 안홀빌딩
경남 경기도 안성시 일죽면 반재리 40-8
대표전화: 02-421-7266