Kanthidin Tab.

칸치딘정 / 500정

▶ 분류번호: 239 ▶ 성상: 백색의 원형정제
▶ 성분·함량: 1정중 돔페리돈(비.피.) ---------- 10mg
▶ 효능·효과: 1. 주효능효과
다음 질환 및 약물투여시 소화기능이상(구역, 구토, 식욕부진, 복부팽만감, 상복부불쾌감, 복통, 가슴쓰림, 트림 등) •성인: 만성위염, 위하수증, 역류성 식도염, 위절제증후군, 항악성종양제 또는 레보도파 투여시 • 소아: 주기성구토증, 상기도감염증, 항악성종양제 투여시
▶ 용법·용량 •성인: 돔페리돈으로서 1회 10-20mg(레보도파투여시 5-10mg) 1일 3회 식전에 경구투여한다. •소아: 1일 체중 kg당 1-2mg을 3회 분할하여 식전에 투여한다. 1일 총투여량은 30mg을 넘지 않는다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.
▶ 사용상의 주의사항
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. 1) 이 약에 불내성인 환자 2) 위운동촉진이 위험한 환자(위장관출혈, 기계적 폐쇄증 또는 천공이 있는 환자) 3) 프로락틴분비성 하수체종 환자(프로락틴선종)
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 1) 소아 2) 간손상 환자
3. 부작용 1) 쇽: 쇽, 아나필락시스양 증상(발진, 발적, 호흡곤란, 안면부종, 구순부종 등)을 일으킬 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 2) 내분비계: 동물실험에서 간뇌의 내분비기능 조절이상에서 유래하는 것으로 추정되는 유선자극, 성주기의 지연 등이, 사람에게는 프로락틴의 상승, 여성형유방, 유방팽만감, 유루증 등이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 나타나는 경우에는 휴약 또는 중지 등의 적절한 처치를 한다. 3) 추체외로계: 드물게 후굴경, 안구측방발작, 상지의 신전 등의 증상이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 중지한다. 또, 이러한 증상이 심한 경우에는 항파킨스제를 투여하는 등 적절한 처치를 한다. 4) 소화기계: 가끔 설사, 변비, 복통, 복부압박감 드물게 구갈, 가슴쓰림, 구역, 구토, 복부팽만감, 일과성 장경련이 나타날 수 있다. 5) 순환기계: 드물게 심계항진이 나타날 수 있다. 6) 정신신경계: 의식장애, 경련이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고, 이상이 인정되는 경우는 투여를 중지하고, 적절한 처치를 한다. 7) 피부: 두드러기, 발진과 같은 알레르기 반응이 나타날 수 있다. 8) 혈액뇌장벽이 아직 성숙되지 않았거나(유아), 손상된 경우에는 신경계 부작용이 나타날 수 있다. 9) 기타: 드물게 발한, 졸음, 동요감, 구갈이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의 1) 이 약은 주로 간에서 대사되므로 간손상 환자에게 이 약을 투여할 경우에는 주의해야 한다. 2) 중증의 신기능 부전 환자(혈청 크레아티닌>6mg/100mL)의 경우 이 약은 소실 반감기가 7.4시간에서 20.8시간으로 증가되었으나 약물의 혈장 농도는 건강지원자에 비해 낮았다. 이 약은 극히 일부만이 미대사상태로 신장을 통해 배설되므로 1회 투여시에는 용량조절이 필요치 않으나 반복투여시에는 신손상의 정도에 따라 투여횟수를 1일 1~2회로 감소시켜야 하며, 용량도 감소시킬 필요가 있다. 장기치료를 요하는 환자는 정기적으로 검사를 받아야 한다.
5. 상호작용 1) 다음 약들과 병용시 내분비기능 조절이상 또는 추체외로 증상이 발현되기 쉬우므로 부득이 병용할 경우에는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다: 페노티아진계 제제(프로클로로페라진, 클로로프로마진, 티에틸페라진 등), 부티로페논계 제제(할로페리돌 등), 라우올피아 알칼로이드 제제(레세르핀 등). 2) 디기탈리스제 포화시의 지표가 되는 구역, 구토, 식욕부진 증상을 은폐하는 수가 있으므로 디기탈리스제를 투여중인 환자에게는 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다. 3) 항콜린제와의 병용에 의해 소화관운동 항진작용이 억제되어 이 약의 위배출 작용이 감소되는 수가 있다. 4) 이론적으로, 이 약의 위운동 촉진작용은 특히 서방형제제나 장용피제제 같은 경구제의 흡수에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 이미 디곡신이나 아세트아미노펜에 안정화된 환자의 경우 이 약의 병용투여는 이들의 혈중 농도에 아무런 영향도 미치지 않았다. 5) 이 약은 신경이완제의 효과를 증가시키지 않는 것으로 알려져 있다. 6) 이 약은 중추작용에 대한 영향없이 도파민효능약(브로모크립틴, 엘-도파)의 소화장애, 구역, 구토와 같은 말초성 부작용을 억제시키는 것으로 알려져 있다. 7) 제산제나 신분비억제제와의 병용투여시 이 약의 생체이용률이 낮아지므로 병용투여하지 않는다. 8) 위장관에 대한 이 약의 작용이 항무스카린 약물과 아편양 진통제에 의해 길항될 수 있다. 9) 이 약은 주로 CYP3A4에 의해 대사되는데, in vitro의 보고에 의하면 CYP3A4 억제제와 병용투여할 경우 이 약의 혈중 농도가 상승함을 보여준다. CYP3A4 억제제로는 다음과 같은 것들이 있다: 아졸계 항진균제, 마크로라이드계 항생제, HIV 단백질분해효소 억제제, 네파조돈
6. 임부 및 수유부에 대한 투여 1) 이 약은 동물실험에서 1일 160mg/kg 용량까지 기형발생 작용을 나타내지 않았고 지금까지 인체에 대한 사용경험으로 볼 때 기형의 위험성을 증가시킨다는 어떤 증거도 발견되지 않았으나 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다. 2) 이 약은 랫트를 사용한 동물실험에서 모유중으로 이행됨이 관찰되었다(주로 대사산물로서 배설: 2.5mg/kg 용량을 경구 및 정맥투여한 후 각각 모유중으로 배설된 최고농도치가 40ng/ml, 800ng/mL로 나타났다.). 이 약은 인체에서도 모유중으로 이행될 가능성이 있으나 신생아에 해를 미치는가에 대해서는 알려져 있지 않다. 따라서 수유부에 대해서는 치료의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
7. 소아에 대한 투여: 소아에게는 과량투여를 피하고 신중히 투여한다. 특히, 1세 이하의 영아에 주의하고, 3세 이하의 영·유아에게는 7일 이상의 연용을 피한다. 이 약은 혈액뇌관문을 거의 통과하지 않으므로 경계 부작용을 유발하지 않으나, 혈액뇌관문이 성숙되지 않은 1세 이하의 영아인 경우에는 신경계 부작용이 나타날 수 있으므로 주의한다.
8. 과량투여시의 처치: 과량투여시 졸음, 방향감각장애가 나타날 수 있으며 특히 소아의 경우 추체외로 증상이 나타날 수 있다. 항콜린제, 항파킨슨 약물 또는 항콜린 효과를 갖고 있는 항히스타민제가 추체외로 증상을 조절하는데 도움이 될 수 있다. 특별한 해독제는 없으며 필요한 경우 위세척 등의 보조수단을 행하고 면밀히 관찰한다. 증상은 보통 24시간 내에 소실된다.
▶ 저장방법: 밀폐용기, 실온보관(1-30℃) ▶ 전문의약품

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 제품을 구입한 약국을 통하여 신제품으로 교환하여 드립니다.

021219

8 806103 903994

제조번호:
사용기한:

PK 주|쎌라트팜코리아
경기도 시흥시 대야동 418-21 (02)312-7500