

아미노산제제

미미엘

연질캡슐

MIMI-L Soft Cap.

L-Cystine은 우리 몸의 단백질을 구성하는 중요성분이며, 녹용중에도 함유되어 있는 아미노산입니다. L-Cystine은 체내에서 환원되어 두 분자의 Cystine을 생성하며, 이 반응은 쉽게 가역적으로 일어나 SH기의 공여 등 생체 산화환원 시스템에 중요한 역할을 합니다. 미미엘은 L-Cystine을 고단위로 함유한 아미노산 제제로 전신권태, 기미, 주근깨, 치료 등 남녀 모두 공용할 수 있는 이상적 제제입니다.

■ 성 상 : 유백색의 액상물질이 든 주황색의 연질캡슐제

■ 성분 · 함량 : 1캡슐중

엘-시스틴(유.에스.피.)	500mg
파라옥시안식향산메칠(약전)	1 mg
파라옥시안식향산프로필(약전)	0.2mg

■ 효능 · 효과

1. 전신권태
2. 약물에 의한 피부염
3. 기미, 주근깨, 햇볕에 탄데 등의 색소침착증
4. 습진, 두드러기, 피부발진, 여드름
5. 손톱, 발톱이나 머리카락이 쉽게 갈라지는 등의 각질부위 질환의 치료 및 예방

■ 용법 · 용량 : 하루에 2-4캡슐을 2-3개월간 계속 복용하거나 한달중 10-20일간 복용한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. : 중증 신기능장애 및 간성혼수
2. 시스틴뇨증인 경우에는 신중히 투여할 것.
3. 복용시 다음 사항에 주의할 것.
 - 1) 때때로 구역, 드물게 설사, 구갈, 가벼운 복통 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 2) 정해진 용법, 용량을 지킬 것.
 - 3) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.(6세 이하의 소아에는 투여하지 말 것.)
4. 복용중 또는 복용후는 다음 사항에 주의할 것.
 - 1) 1개월정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
5. 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
 - 3) 오용을 피하고 품질을 보호유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온보관(1-30℃) ■ 포장단위 : 90, 120, 180, 360캡슐

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 재정경제부고시 "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

문안작성일 : 2004. 7. 29



주 | **셀라트팜코리아**
경기도 시흥시 대야동 418-21