일반의약품 분류번호 : 114

소염 · 진통제

크로스탄정 CROSTAN Tab.

■ **성상** : 주황색의 장방형 필름코팅정

■ **성분· 함량** : 1정중 클로닉신리신(식약청고시98-127호) ---------- 125mg

■ **효능· 효과** : 1. 다음 질환에 사용할 수 있다.

류마티양 관절염, 근육통, 신경통, 외상후· 수술후 동통, 두통, 치통, 이통, 월경통

■ **용법· 용량**

성인 : 클로닉신리신으로서 1회 125-250mg(1-2정) 1일 3회 경구투여한다. 연령 · 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 경고 : 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 소화성궤양 환자 2) 이 약에 과민증 환자 3) 임부
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.: 1) 소화성궤양의 병력이 있는 환자
   2) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
4. 부작용
   1) 소화기 : 장기투여시 위장관에 대한 부작용 특히 위장출혈, 소화성궤양 및 천공이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
   2) 기타 : 때때로 구역, 현기증, 졸음, 두통, 식은땀, 한기, 다행증이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
   1) 소염진통제에 의한 치료는 원인요법이 아닌 대증요법임에 유의한다.
   2) 만성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
      ① 장기투여하는 경우 정기적인 임상검사(요검사, 혈액검사, 간기능검사 등)를 하고 이상이 있을 경우 감량, 휴약 등의 적절한 조치를 한다.
      ② 약물요법 이외의 치료법도 고려한다.
   3) 급성질환에 사용하는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
      ① 급성염증, 동통 및 발열의 정도를 고려하여 투여한다.
      ② 원칙적으로 동일한 약물의 장기투여는 피한다.
      ③ 원인요법이 있으면 그것을 실시한다.
   4) 환자의 상태를 충분히 관찰하고 부작용의 발현에 유의한다.
   5) 감염증을 불현성화할 우려가 있으므로 감염에 의한 염증에 대해 사용할 경우에는 적절한 항균제를 병용하고 관찰을 충분히 하여 신중히 투여한다.
   6) 다른 소염진통제와 병용은 피하는 것이 바람직하다.
   7) 고령자 및 어린이에 있어서 필요한 최소량으로 신중히 투여하고 부작용의 발현에 특히 유의한다.
6. 상호작용 : 이 약은 혈액응고에 영향을 주지 않으므로 혈액응고와 관련한 용량조절은 필요하지 않다.

■ **저장방법** : 기밀용기, 실온보관(1-30℃) ■ **포장단위** : 10, 100, 500, 1000정

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 제품을 구입한 약국을 통하여 신제품으로 교환하여 드립니다.

030424

PK 주 쎌라트팜코리아
경기도 시흥시 대야동 418-21

※소비자상담 : 02)312-7500(학술부)