

게리동정

GERIDONG Tab

일반의약품

분류번호114

解熱 鎮痛作用은 生理學的으로 볼 때 주로 視床에 作用點이 있어 痛覺中樞를 抑制시킴으로서 鎮痛效果와 解熱效果를 나타 내거나 또는 炎症에 동반하는 過敏性疼痛에 依를 上昇시키는 末梢作用에 依하여 解熱鎮痛效果를 나타낸다.
본 「게리동정」은 이러한 藥理機轉에 依한 迅速하고 強力한 解熱鎮痛作用뿐만 아니라 항히스타민 作用, 즉 鼻腔, 咽 頭氣管支 支氣管의 炎症으로 誘發되는 기침, 콧물, 가래症狀 등은 生體組織內의 히스타민生成與否로 起因된다.
이러한 히스타민의 生成을 抑制시켜주는 抗히스타민劑의 解熱鎮痛劑의 效果의인 複合으로 相乘作用은 물론 副作用이 없는 새로운 조성의 綜合解熱鎮痛 및 感氣藥이다.

■원료약품의 분량 : 1정 (550밀리그램) 중

아세트아미노펜(약전)	200밀리그램
에덴자미드(약전)	100밀리그램
무수카페인(약전)	30밀리그램
말레인산클로르페니라민(약전)	2밀리그램

■성상 : 분홍색 삼각원형정제

■특징

1. 약리효과가 신속하고 지속적이며 배설이 용이하다.
체내대사가 신속하여 흡수후 30~60분에 혈중농도에 달하며 5~7시간이면 85% 이상이 요중으로 배설된다.
2. 상승작용으로 해열진통효과가 강력하다.
살리실산, 아세트아니린제의 단독제제보다 해열진통효과가 2~3배 강력하고 지속적이며 평열일 때는 체온에 영향을 주지 않는다.
3. 항히스타민작용을 한다.
여러 가지 원인에 의한 알레르기 반응을 억제하여 히스타민성 동통은 물론 감기의 진행을 방지하여 코감기, 기관지천식, 목감기에도 적용이 가능하다.
4. 안전성이 우수하고, 습관성이 없어서 부작용이 거의 없다.
투여후 5~7시간이면 요중에 거의 배설이 되기 때문에 축적작용과 탐약성이 없으며 위장장애, 시아노시스, 빈혈, 신장장애 등의 부작용이 거의 없다.

■효능·효과 : 감기의 증상상(오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통, 콧물, 코막힘, 재채기, 인후통)의 완화

■용법·용량 : 성인 1회 2정, 1일 3회 식후 30분에 복용한다. 어린이 1회 7~14세 1정

■사용상의 주의사항

1. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 집속성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르 기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
- 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 유·소아 및 어린이(14세이하)
- 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람.
- 5) 독내장(예 : 눈의 통증, 눈의 침침함 등)이 있는 사람, 매독 곤란이 있는 사람.
- 6) 수유부
- 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

2. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것

- 1) 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것. 진해거담약, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등.

- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.
- 4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우는 1세 미만의 유아에는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.

3. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고, 의사, 약사와 상의할 것.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것.
- 3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 4) 장기 연용하지 말 것.
- 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사, 약사와 상담할 것.
 - (1) 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴 답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우.
 - (2) 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우.
 - (3) 천식이 나타난 경우.
- 6) 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량 투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

4. 다음 사람은 복용하지 말 것.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람.
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람.

5. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 적사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오염을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

6. 경고 : 매일 3잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

■저장방법 : 기밀용기에 넣어 실온(1~30℃)에 보관하십시오.

■사용기간 : 제조일로부터 36개월

■포장단위 : 자사포장단위

약은 어린이아이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.