이담소화

가레오®

연질 캡슐

(디히드록시디부틸에텔)

Galeo® soft cap.

일반의약품 | 분류번호:236

이 의약품은 유럽의 Lusofarmaco I.L.F.I 제약회사의 연구진에 의하여 개발되어 각광을 받고 있는 제품으로 담즙분비를 촉진시켜 영양의 소화, 흡수를 증대시키며, 활발한 장 운동으로 복부팽만감, 트림 등의 증상을 개선하여 인체장기중 중요한 기관인 담낭 등의 약화된 기능을 회복하고 강화시켜주는 제품입니다.

성 상

250mg : 일면 유백색, 일면 흑색의 타원형 연질캡슐제

500mg : 투명한 액상의 내용물이 든 일면 유백색, 일면 흑색의 장방형 연질캡슐제

원료약품 및 그 분량

1연질캡슐 중

250mg : 디히드록시디부틸에텔(식품의약품안전청고시) ····· 250mg
파라옥시안식향산메칠(약전) ····· 0.44mg
파라옥시안식향산프로필(약전) ····· 0.09mg

500mg : 디히드록시디부틸에텔(식품의약품안전청고시) ····· 500mg
파라옥시안식향산메칠(약전) ····· 0.36mg
파라옥시안식향산프로필(약전) ····· 0.09mg

약리작용 및 특징

1. 담즙분비 촉진작용이 강력합니다.
2. 소화작용이 우수합니다.
3. 식욕증진작용이 왕성합니다.
4. 영양분 대사작용이 합리적입니다.
5. 장운동을 활성화하여 줍니다.
6. 복부팽만감을 없애 줍니다.

효능 및 효과

다음 질환에 사용할 수 있다.
소화불량증상(복부팽만감, 소화의 지연, 트림, 구역)의 치료

용법 및 용량

성인 - 디히드록시디부틸에텔로서 1회 0.5 ~ 1.0g, 1일 3회 식전에 경구 투여한다. 씹지말고 삼킨다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
   1) 녹내장 환자
   2) 요로, 전립선 환자(요저류의 위험성이 있다.)
   3) 담도폐쇄 환자
   4) 중증의 간세포기능부전 환자
2. 상호작용
   1) 레세르핀유도체와 병용투여시 담도의 운동성에 대한 길항작용에 의해 이 약 효과가 감소될 수 있다.
   2) 이담제와 병용투여시 이 약의 이담효과를 상승시킨다.

저장방법

밀폐용기

포장단위

250mg : 10, 30, 60, 100, 500, 1000캡슐
500mg : 60, 100, 300, 500캡슐

* 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.
* 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시기 바랍니다.

문안작성일 : 2003. 9. (Rev. 6)

ISO9001인증업체 | KGMP적격업체

조아제약(주)
CHO-A PHARM.CO.,LTD.

· 본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7
· 인터넷홈페이지 http://www.choa.co.kr
· 공장 : 경남 함안군 함안면 파수리 465
· 수신자부담소비자상담실 : 080-988-8888