순환계 질환 치료제

게리틴® 연질캡슐

Geritin soft caps.

일반의약품 | 분류번호 : 219

인체는 30세 전후 서서히 노화가 시작되면서 순환기장애 등의 증상을 수반하며 중년기 이후 고령화되면 동맥경화, 피로, 고혈압, 심질환 등의 제증상을 동반한 각종 성인병이 나타날 수 있습니다.
게리틴연질캡슐은 강심 · 강장제로 널리 알려진 Hawthorn Ex, Mistletoe Ex, Garlic Ex와 Thiamine, 비타민E를 이상적으로 배합한 복합처방의 성인병 예방치료제로 심질환, 순환장애, 고혈압에 의한 여러 증상을 개선시키는 제품입니다.

성 상

미황색의 액체가 든 일면 적색, 일면 갈색의 타원형 연질캡슐제

원료약품 및 그 분량

1캡슐 중

미스트레토우엑스(별규)	60mg
하우소른엑스(별규)	60mg
(프로안토시아니딘으로서 0.2mg)	
마늘엑스(별규)	150mg
(알리신으로서 90㎍)	
질산치아민(약전)	5mg
초산토코페롤(약전)	50mg
파라옥시안식향산메칠(약전)	0.85mg
파라옥시안식향산프로필(약전)	0.17mg

효능 및 효과

심질환, 순환장애, 고혈압에 의한 여러증상의 개선

용법 및 용량

성인 1회 1캡슐, 1일 1~2회 복용한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. - 구성성분에 과민증 환자
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
   1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
3. 부작용
   1) 소화기계 : 위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다.
   2) 피 부 : 발진, 발적 등이 나타날 수 있다.
   3) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수도 있다.
   출혈이 오래 지속될 경우에는 약사 또는 의사와 상의한다.
   4) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자에 비타민 E를 투여할 경우에는 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
4. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
   2) 이 약의 투여에 의해 부작용이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
5. 저장상의 주의
   1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

저장방법

기밀용기

포장단위

10, 30, 90, 200, 300, 500캡슐

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환하여 드립니다.

개정 : 2004. 2. (Rev. 5)

ISO9001인증업체 | KGMP적격업체

조아제약(주)
CHO-A PHARM.CO.,LTD.

· 본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7 · 공장 :경남 함안군 함안면 파수리 465
· 인터넷홈페이지 http://www.choa.co.kr · 수신자부담소비자상담실: 080-988-8888