

간장 활성화제

헵로스[®] 시럽

Hepos Syrup

일반 의약품 | 분류번호 : 391

「간장은 인체에 필요한 영양의 관리자이며, 또한 배급자이다.」 라는 말은 간장이 인체내 물질대사의 중추가 되어 단백질, 당분, 지방, 호르몬, 비타민, 알코올 등의 신진대사를 행하고 있음을 알려줍니다. 그러므로 간장의 신진대사 기능이 저하되면 쉽게 피로해지고 전신이 나른해지므로 집중력이나 지속력이 떨어지고, 식욕부진 등의 증상도 나타나게 됩니다. 본 제재 헵로스(Hepos)는 프랑스의 Laphal Group의 Laphal Laboratoires와 기술 제휴한 제품으로 간장질환으로 인한 재증상을 치료하는데 효과가 있습니다.

성상 | 옅은 담갈색의 액체가 들어있는 앰플, 병, 플라스틱 용기

원료약품 및 그 분량 | 100mL 중

L-아르기닌(EP)	7.31g
구연산(약전)	2.94g
염산베타인(USP)	5.00g
(베타인으로서 3,813.2mg)	
베타인(별규)	5.00g
파라옥시안식향산메칠나트륨(BP)	0.05g
파라옥시안식향산프로필나트륨(BP)	0.05g

효능 및 효과 | 간질환의 보조치료

용법 및 용량

성인 : 1일 10~30mL를 식간에 분할 복용한다.
이 약 10mL를 약 반 컵의 물에 희석하여 복용한다.

저장 방법 | 차광한 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장 단위

10mL×1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 60앰플
15mL×1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30앰플
20mL×1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30앰플
30mL, 40mL, 50mL, 60mL, 90mL, 100mL, 500mL

↓ 뒷면계속

KGMP적격업체



조아제약(주)
CHO-A PHARM CO., LTD.

· 본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7
· 인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

· 공장 : 경남 함안군 함안면 파수리 465
· 수신자부담소비자상담실 : 080-988-8888

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 신질환 환자, 심근경색 및 그 병력이 있는 환자
 - 2) 이 약은 알콜중독시 해독제로 사용할 수 없다.
- 기타 이 약을 복용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 지킬 것.
 - 2) 이 약은 내복제용으로만 사용하고 주사용으로 사용하지 말 것.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

 - 1) 이 약의 복용으로 이상반응이 나타나는 경우
 - 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 습기가 적고 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품의 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

* 앰플 내에 소량의 침전이 생길 수 있으나 제품의 품질에는 이상이 없으니 잘 흔들어 복용하십시오.

- * 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환하여 드립니다.
- * 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어 주시고 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
- * 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주십시오.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드러그(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)를 참조하십시오.
- * 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청에 전달하십시오.

문안작성일 : 2008. 2. 20. (Rev. 15)



경구용 앰플 복용법

1. 한쪽끝을 톱 잘라줍니다.

한쪽손으로 앰플을 감싸쥐고,
다른 손은 앰플의 절단선 가
까이 잡고 선부분을 가볍게
힘주어 톱 잘라줍니다.

2. 자른면을 컵에 대고

반대편을 톱 잘라줍니다.
컵에 1앰플을 따서 음용합니다.
(기호에 따라 반컵 정도의 물 또는
드링크류에 혼합하여 음용하셔도
됩니다.)



본 제품에 사용된 앰플은 의장등록된 포장용기입니다.
(의장등록 제190186호)