

뇌·말초 혈액순환 개선제

# 바소크린액

## VASOCLEAN Soln.

일반의약품 | 분류번호:219

인간은 나이가 들어감에 따라 신체와 뇌의 다양한 조직들이 차츰 퇴화하기 시작하여 혈액순환장애가 나타납니다. 이로부터 이명과 시력감퇴, 하지경련 등의 말초 혈액순환장애가 시작되며, 특히 뇌혈류량의 감소로 인해 뇌세포의 산소와 영양의 부족이 심해지고, 집중력 및 기억력 장애 등의 뇌기능 부전현상이 나타나게 됩니다. 바소크린액은 순수 천연생약성분의 은행엽엑스제제로서 이러한 노화에 따른 증상들의 초기 예방 및 치료에 안전하고 효과적인 제제입니다.

바소크린(순수 천연 은행엽엑스제제)액의 키크고폴라본성분은 혈액, 조직, 혈관에 총체적으로 작용하여, 혈액순환 개선, 혈형개선 및 뇌기능 부전에 유용하며, 노화와 발암의 원인이 될 수 있는 Free radical(유리기)의 제거에 효과적인 기능을 발휘하는 뇌·말초 혈액순환 종합 개선제입니다.

**성상** | 담황색의 액제가 들어있는 앰플

**원료약품 및 그 분량** | 20mL 중

은행엽엑스(DAB)..... 40mg  
첨가제(보존제): 벤조산나트륨..... 20mg

### 약리작용 및 특징

1. 뇌기능 강화  
바소크린액은 뇌혈류량을 증가시켜 뇌로의 산소, 포도당 공급을 증가시킴에 따라 기억력과 집중력을 향상시킵니다.
2. 순환기계 향상  
바소크린액은 혈소판 응집기능을 가진 PAF(platelet activating factor)에 작용하여 혈전생성을 억제하고, 혈관벽의 탄력성과 투과성을 향상시킴에 따라 동맥경화 예방, 심혈관 확장 및 순환기계 등의 말초동맥 순환장애를 개선합니다.
3. 복합 약리작용  
바소크린액은 노화와 발암의 원인을질로 밝혀진 Free radical의 제거와 뇌에서의 혈액순환 및 말초동맥 순환장애를 개선함으로써 노인성 치매 및 퇴행성 질환들을 예방할 수 있습니다.
4. 바소크린액은 부작용이 거의 없는 키크고폴라본제제로 장기복용에도 안전하여 뇌와 말초의 혈액순환 개선을 위해 일차적으로 선택되어질 수 있습니다.

### 효능 및 효과

1. 주효능·효과
  - 1) 말초동맥 순환장애(간헐성 파행증)의 치료
  - 2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명
  - 3) 이명, 두통, 기억력감퇴, 집중력장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능장애의 치료

### 포장단위

1앰플(20mL) × 1, 10, 20, 30

### 저장방법

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

↓ 뒷면계속

KGMP적격업체

**조아제약(주)**  
CHO-A PHARM.CO.,LTD.

· 본사 : 서울특별시 영등포구 문래동 37가 55-7  
· 인터넷홈페이지 <http://www.choa.co.kr>

· 공장 : 경남 함안군 함안면 피수리 465  
· 수신자부담소비자상담실 : 080-988-8888

## 용 법 및 용 량

성인

- 1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명 : 은행엽엑스로서 1회 40mg 1일 3회 또는 1회 80mg 1일 2회 경구투여한다.
- 2) 기질성 뇌기능장애 : 은행엽엑스로서 1회 40~80mg 1일 3회 또는 1회 120mg 1일 2회 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

## 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것. - 이 약에 과민증 환자
2. 부작용  
드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.
3. 일반적 주의  
1) 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.  
2) 이 약은 벤조산나트륨을 포함하고 있으며, 벤조산은 피부, 눈, 점막에 경미한 자극이 될 수 있다.
4. 임부에 대한 투여  
동물실험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.
5. 소아에 대한 투여  
소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.
6. 적응상의 주의 - 이 약은 내복으로만 사용한다.
7. 저장상의 주의사항  
직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 꾀한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용 전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드려(<http://ezdrug.kfda.go.kr> → [정보마당] → [의약품 등 정보]를 참조하십시오.


※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청에 전달하십시오.

문안작성일 : 2008. 5. 20 (Rev. 9)

### 경구용 앰플 복용법

1. 한쪽 끝을 톱 잘라줍니다.  
한쪽손으로 앰플을 감싸쥐고, 다른 손은 앰플의 절단선 가까이 잡고 선부분을 가볍게 힘 주어 톱 잘라줍니다.

2. 자른면을 컵에 대고 반대편을 톱 잘라줍니다.  
1의 자른면을 컵에 대고 1과 동일방법으로 반대편도 톱 잘라주면 액이 나옵니다.



본 제품에 사용된 앰플은 의장등록된 포장용기입니다.  
(의장등록 제190186호)