피부세포 활성화제

리보테인정

Riboteine Tab.

일반의약품	분류번호:313

피부는 외부로부터 신체를 보호하는 동시에 전신의 대사에 필요한 생화학적 기능을 영위하는 신체의 중요한 기관으로, 신체내부의 건강상태를 반영하는 구실을 합니다.

현대인들의 피부는 자외선 및 공해물질, 먼지와 오염된 대기 등 외부적인 요인 뿐 아니라 각종 스트레스와 편식 등으로 인해 피부 거칠어짐 및 피부염 등 잦은 피부 트러블이 발생하게 됩니다. 이런 피부세포가 활발하게 성장하고 증식하기 위해서 적절한 영양공급이 필요합니다.

비타민은 필수영양소로서 피로회복, 식욕증진, 피부건강, 산화방지 등에 효과가 있으며, 특히 피부비타민으로 일컬어지기도 하는 비타민 B군은 건강한 피부를 유지하는데 필수적인 비타민으로 여드름의 주원인인 지나친 피지 분비를 막아주고 염증이 생기는 것을 방지해 줍니다.

리보테인정은 이러한 비타민 B군 4종과 L-시스테인을 복합처방한 제품으로, 신체내에 영양을 공급하여 건강하고 매력적인 피부를 가꾸고 유지하는데 필수적인 제품입니다.

성 상

연분홍색 원형 당의정

원료약품 및 그분량

1정 중

낙산리보플라빈(약전)	6.66mg
염산피리독신(약전)	33.33mg
니코틴산아미드(약전)	20.00mg
비오틴(USP)	165.00㎍
L-시스테인(DAB)	40.00mg

약리작용 및 특징

1. 리보테인정은 비타민 B_2, B_6, 니코틴산아미드, 비오틴 등 피부와 점막에 관여하는 비타민을 복합처방한 제품으로 여드름, 거친 피부, 입술 물집 또는 입안이 헐었을 때 복용하시면 효과가 좋습니다.
2. 리보테인정은 사춘기 청소년 및 여성의 미용 뿐만 아니라 피로회복, 체력저하시에도 좋습니다.

효능 및 효과

o 다음 경우의 비타민 B_2, B_6의 보급
- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
  · 비타민 B_2(낙산리보플라빈), B_6(염산피리독신)
  · 다음 증상의 완화 - 구각염, 구순염, 구내염, 설염, 습진, 피부염

⬇ 뒷면계속

ISO 9001 | K G M P

조아제약(주)
CHO-A PHARM.CO.,LTD.

본사:서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7 공장:경남 함안군 함안면 파수리 465
인터넷홈페이지 http://www.choa.co.kr 수신자부담소비자상담실:080-988-8888

용법 및 용량

8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 1정, 1일 3회 식후 복용

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것
   1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
   2) 3개월 미만의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
   1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
   2) 임부, 수유부
3. 부작용
   1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다. : 구역, 식욕부진, 복부팽만감
   2) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
   3) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucosetolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
4. 일반적 주의
   1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
   2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 상호작용
   1) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용 투여하지 않는다. 레보도파
6. 임상검사치에의 영향
   1) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
7. 저장상의 주의사항
   1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
   2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
   3) 오 · 남용을 피하고, 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

포장단위

30, 45, 60, 90, 100, 500, 1000정

저장방법

기밀용기, 실온(1~30℃)보관

* 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
* 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.
  만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국이나 본사 및 각 영업소에서 교환해 드립니다.

개정: 2003. 10. (Rev.5)